

NORMANDELINE


Juliette X Emeraude



HZPC
keeps you growing

Conselhos gerais na produção de batata de consumo

- **Cozedura firme**
- **Calibre e forma dos tubérculos uniformes**
- **Boa tolerância a condições de seca**
- **Boa tolerância a golpes**
- **Boa capacidade de Armazenamento**



Propriedades agronómicas

Maturação	61	Semi tardia
Período de dormência	91	Muito Longo
Produto final maturação	83	Moderado
Tamanho tubérculos	66	Pequeno
Forma dos tubérculos		Alongada-oval/Alongada
Numero de tubérculos		12-14
Cor da pele		Amarela
Polpa após cozinhar		Amarela
Tipo culinário		A - Firme
Peso de matéria seca/Aln		19,4% / 14,2%
Teor de matéria seca/Pes		367 / 1,078
Enegrecimento interno	4	Não sensível
Sens. ao Metribuzin	78	●●●●●○



Cor da pele e carne



Tipo culinário



Maturação

Densidade de Plantação

Mercado: 35-55 mm.

Calibre	Densidade de plantação/ha	Distancia entre linhas	
		75 cm	90 cm
30/40	44.000	30	25
40/45	42.000	32	26
45/50	40.000	33	28

Resistências

Mildio da folha	52	●●●●○●
Mildio do tuberculo	70	●●●●○●
Sarna comum	45	●●●●○●
Sarna pulverolenta	58	●●●●○●
Spraing	99	●●●●●●
PVY	70	●●●●○●
Yntn tolerancia tubérculos	99	●●●●●●

Res. aos nematodos

Ro1/4 *1	●●●●○●
Ro2/3	●●●●○●
Ro5	●●●●○●
Pa2 *1	●●●●○●
Pa3 *1	●●●●○●

Res. verruga

F1	●●●●○●
F2	●●●●○●
F6	●●●●○●
F18	●●●●○●

* HZPC own analysis/no official analysis

Fertilização

-
- **Azoto (N):** Aplicação média (170-210Kg N/ha incluindo a disponibilidade no solo).


NORMANDELINE

Juliette X Emeraude



HZPC
keeps you growing

Conselhos gerais na produção de batata de consumo



Preparação e Plantação

- NORMANDELINE tem uma boa dormência.
- Aquecer corretamente a semente e plantar com pequenos grelos brancos.
- Tratar sempre as sementes de NORMANDELINE e o solo contra Rhizoctonia.
- Plantação em solos quentes, não plantar muito cedo.
- Evitar solos com risco elevado de sarna comum.




Cultivo

- A emergência é um pouco lenta, posteriormente a planta desenvolve-se bem.
- NORMANDELINE tem boa tolerância à Metribuzina.
- Aconselham-se pulverizações preventivas contra o Míldio.



Defenagem e Colheita

- Mínimo de 3 semanas entre a dessecagem das plantas e o arranque para ter uma pele completamente firme.
- Evitar danos mecânicos para melhorar o armazenamento.



Armazenamento

- Com as corretas condições, NORMANDELINE é adequada para armazenar longo período de tempo
- Temperatura de armazenamento: 4 °C.
- Como NORMANDELINE tem uma dormência longa, a quantidade de anti-abrolhantes pode ser reduzida em armazenamentos a longo prazo.