




Anbauempfehlung Speisekartoffeln CRISPS

- Sehr gut geeignet für den Frühkartoffelanbau
- Flexibilität bei der Verarbeitung vom Feld und aus dem Lager
- Sehr gut geeignet für die frühe Ernte
- Konstant hoher Trockenmassegehalt



Sorteneigenschaften

Reifezeit	68	Mittelfrüh
Keimruhe	60	Mittel
Ertrag	90	Ziemlich gut
Sortierung	80	Großfallend
Knollenform		Rund-oval
Knollenzahl		12-14
Schalenfarbe		Gelb
Fleischfarbe kochen		Gelb
Kochtyp		B - Vorwiegend Mehlig
TS/Stärke %		24,6% / 18,7%
UWG/Spec. Gewicht		460 / 1,1
Blaufleckigkeit	16	Empfindlich
Metribuzin Empf.	60	●●●●●
Knöllchensucht	88	●●●●●



Schalen und Fleischfarbe



Kochtyp



Reifezeit

Pflanzabstände

Sortierung	Knollenzahl/ha	Reihenabstand	
		75 cm	90 cm
28/35	55 000	24	20
35/45	44 000	30	25
35/50	42 000	32	26
50/60 geschnitten	48 000	28	23

Pflanztiefe: normal

Resistenz

Krautfäule	44	●●●●●
Knollenfäule	60	●●●●●
Alternaria	48	●●●●●
Schorf	68	●●●●●
Pulverschorf	65	●●●●●
Eisenfleckigkeit	55	●●●●●
Y-Virus	30	●●●●●
Yntn Knollentoleranz	99	●●●●●

Nematodenresist.

Ro1/4	8	●●●●●	F1	10	●●●●●
Ro2/3		●●●●●	F2		●●●●●
Ro5		●●●●●	F6	*5	●●●●●
Pa2		●●●●●	F18		●●●●●
Pa3		●●●●●			

* HZPC-eigene Analyse / Keine offizielle Analyse

Düngung

- Volle Stickstoffgabe beim Pflanzen ausbringen, für eine frühe Jugendentwicklung
- Stickstoff (N): Mittlerer Bedarf (170-210kg N/Ha inklusive Bodenversorgung).
- Kalium- und Phosphatdüngung nach Standardempfehlung.
- Eine Kaliumgabe im Frühling steigert die Toleranz gegen Blaufleckigkeit.



Anbauempfehlung Speisekartoffeln CRISPS




Vorbereitung und Pflanzung

- NORMAN hat eine lange Keimruhe.
- Vorkeimen trägt zur Ernteverfrühung bei.
- Das Pflanzgut vor dem Pflanzen erwärmen und leicht gekeimt pflanzen.
- Die besten Ergebnisse werden auf leichteren Böden erzielt.
- Auf leichten Böden mit freilebenden Nematoden besteht ein erhöhtes Risiko auf Eisenfleckigkeit. Verwenden Sie wenn möglich ein Nematizid.
- Auf empfindlichen Böden sollte, wenn möglich, eine Bodenbehandlung gegen Rhizoctonia durchgeführt werden.




Anbau

- Die Entwicklung ist gleichmäßig, mit einer guten Laubentwicklung.
- hat einen frühen Knollenansatz.
- NORMAN läuft schnell auf.
- NORMAN ist empfindlich gegen Metribuzin, nur im Voraufbau anwenden.
- Die Krautfäulebehandlungen regelmäßig durchführen, um Kraut- und Knollenfäule vorzubeugen.



Krautregulierung und Ernte

- NORMAN ist anfällig für Blaufleckigkeit und mechanische Beschädigungen.
- Beim Grünroden oder Ernten kurz nach der Krautregulierung ist eine gute Abtrocknung und schnelles Herunterkühlen wichtig, um eine schöne Schale zu erhalten.



Lagerung

- NORMAN ist eine frühe Sorte und die Vermarktung sollte innerhalb von 5 Monaten nach der Ernte erfolgen.