



Teeltadvies Consumptieteelt CRISPS

- Zeer geschikt voor vroege teelt
- Flexibiliteit in verwerking vanuit veld en opslag
- Zeer geschikt voor vroege teelt
- Consistent en hoog drogestofgehalte



Landbouwkundige eigenschappen

Rijptijd	68	Midden vroeg
Kiemrust	60	Gemiddeld
Opbrengst rijp	90	Redelijk
Grofheid	80	Grof
Knolvorm		Rondovaal
Knolaantal		12-14
Schilkleur		Geel
Vleeskleur na koken		Geel
Kooktype		B - iets kruimig
Droge stof/Zetmeel %		24,6% / 18,7%
OWG/Soortelijk gewicht		460 / 1,1
Blauwgevoeligheid	16	Gevoelig
Sencor gevoeligheid	60	● ● ● ● ●
Onderzeeërvorming	88	● ● ● ● ●



Schil- en vleeskleur



Kooktype



Rijptijd

Plantafstanden

Maat	Knollen/ha	Rijafstand	
		75 cm	90 cm
28/35	55.000	24	20
35/45	44.000	30	25
35/50	42.000	32	26
50/60 gesneden	48.000	28	23

Plantdiepte: standaard, maaivelddiepte.

Resistenties

Phytophthora loof	44	● ● ● ● ●
Phytophthora knol	60	● ● ● ● ●
Alternaria	48	● ● ● ● ●
Schurft	68	● ● ● ● ●
Poederschurft	65	● ● ● ● ●
Kringerigheid	55	● ● ● ● ●
Y-virus	30	● ● ● ● ●
Yntn-virus knoltolerantie	99	● ● ● ● ●

Aardappelmoetheid

Ro1/4	8	● ● ● ● ●
Ro2/3		● ● ● ● ●
Ro5		● ● ● ● ●
Pa2		● ● ● ● ●
Pa3		● ● ● ● ●

Wratziekte

F1	10	● ● ● ● ●
F2		● ● ● ● ●
F6	*5	● ● ● ● ●
F18		● ● ● ● ●


* HZPC eigen meting / Geen officiële meting

Bemesting

- Stikstof in 1 keer toedienen voor een vroege beginontwikkeling.
- Stikstof (N) : Normale dosering (170-210Kg N/Ha inclusief bodemvoorraad)
- Fosfaat (P) en Kalium (K) : volgens standaard advies.
- Een verse kaligift wordt aangeraden om blauw te voorkomen.



Teeltadvies Consumptieteelt CRISPS



Voorbehandeling en poten

- NORMAN heeft een lange kiemrust.
- Maatregelen om de teelt te vervroegen zijn aan te bevelen.
- Warm het pootgoed op en plant de knollen met witte puntjes.
- Lichtere grondsoorten zullen de beste resultaten geven.
- Op lichte gronden met vrijlevende aaltjes is er een verhoogd risico op kringerigheid. Gebruik nematicides.
- Op Rhizoctonia-gevoelige gronden wordt een grondbehandeling geadviseerd.




Teelt

- De opkomst is gelijkmatig, met een goede loofontwikkeling.
- NORMAN heeft een vroege knolzetting.
- NORMAN heeft een vlotte opkomst.
- NORMAN is gevoelig voor metribuzin, kan alleen voor opkomst gespoten worden.
- Houd een strak spuitschema aan, vanwege gevoeligheid voor Phytophthora in loof.



Loofdding en oogst

- NORMAN is vrij gevoelig voor stootblauw en rooibeschadiging. Beperk de valhoogte en voorkom mechanische beschadiging.
- Zorg bij groenrooi of kort na loofdding voor snelle droging en koeling voor behoud van schilkwiteit.



Bewaring

- NORMAN is een vroeg ras. De afzet vindt meestal binnen 5 maanden na de oogst plaats.