




Teeltadvies Consumptieteelt TRADITIONAL FRESH

- Hoge opbrengst
- Brede aanpassing aan weersomstandigheden
- Geschikt voor winterteelt
- Zeer lage stikstofbehoefte
- Goed resistentiepakket



Landbouwkundige eigenschappen

Rijptijd	39	Laat
Kiemrust	72	Lang
Opbrengst rijp	110	Hoog
Grofheid	84	Grof
Knolvorm		Ovaal
Knolaantal		9-11
Schilkleur		Geel
Vleeskleur na koken		Licht geel
Kooktype		B - iets kruimig
Droge stof/Zetmeel %		20,2% / 14,3%
OWG/Soortelijk gewicht		369 / 1,079
Blauwgevoeligheid	14	Vrij gevoelig
Sencor gevoeligheid	80	● ● ● ● ●
Onderzeeërvorming	65	● ● ● ● ●



Schil- en vleeskleur



Kooktype



Rijptijd

Plantafstanden

Maat	Knollen/ha	Rijfstand	
		75 cm	90 cm
28/35	50.000	27	22
35/45	44.000	30	25
35/55	42.000	32	26
50/55	40.000	33	28
55/65	37.000	36	30

Plantdiepte: standaard, maaivelddiepte.

Controleer altijd het knolaantal voor een juiste berekening.

Resistenties

Phytophthora loof	63	● ● ● ● ●
Phytophthora knol	73	● ● ● ● ●
Alternaria	70	● ● ● ● ●
Schurft	69	● ● ● ● ●
Poederschurft	61	● ● ● ● ●
Kringerigheid	81	● ● ● ● ●
Y-virus	28	● ● ● ● ●
Yntn-virus knoltolerantie	99	● ● ● ● ●

Aardappelmoeheid

Ro1/4 *1	● ● ● ● ●
Ro2/3 *1	● ● ● ● ●
Ro5 *1	● ● ● ● ●
Pa2 *1	● ● ● ● ●
Pa3	● ● ● ● ●

Wratziekte

F1	10	● ● ● ● ●
F2	*3	● ● ● ● ●
F6	*3	● ● ● ● ●
F18	*1	● ● ● ● ●


* HZPC eigen meting / Geen officiële meting

Bemesting

- Pas de bemesting aan op basis van de resultaten van de bodemanalyse.
- Raadpleeg altijd de lokale en huidige regels over gewasbemesting.
- Deelgift wordt aanbevolen, 4/5 voor het planten en 1/5 na het planten.
- Stikstof (N) : Erg lage dosering (120Kg N/Ha inclusief bodemvoorraad)
- Een kali (KCL) gift vlak voor de bloei verlaagt de kans op blauwgevoeligheid.
- Fosfaat (P) : volgens standaard advies.
- Gebruik geen organische bemesting.



Teeltadvies Consumptieteelt TRADITIONAL FRESH



Voorbehandeling en poten

- Maatregelen om de teelt te vervroegen zijn aan te bevelen.
- PANAMERA is geschikt voor alle grondsoorten.
- Vermijd gronden met risico op poederschurft.
- Zorg voor een goede rugopbouw om groene knollen te voorkomen.
- Voor herfst/winterteelt wordt een knolbehandeling tegen Rhizoctonia aanbevolen.
- Als het pootgoed voor herfst/winterteelt afkomstig is van de voorjaarsteelt, moet dit niet in de koeling bewaard worden.




Teelt

- PANAMERA heeft een trage opkomst maar het loof ontwikkelt zich sterk in een later stadium.
- PANAMERA heeft een goede tolerantie tegen metribuzin.
- Ondanks de hoge resistentie tegen Phytophthora is een preventieve behandeling gewenst, vanwege het lange groeiseizoen.
- PANAMERA is vatbaar voor aardappelzwabbertopvirus (PMTV), dat overgebracht wordt door poederschurft.



Loofdoding en oogst

- In het algemeen laten de knollen goed los en is PANAMERA vroeg huidvast.
- De schil moet volledig zijn afgehard voordat er kan worden geoogst.
- De aardappels zijn grof. Oogst en bewaar voorzichtig om beschadiging en blauw te voorkomen.



Bewaring

- Product gerooid onder goede omstandigheden, kan na de wondheling snel worden gekoeld.
- PANAMERA heeft een lange kiemrust en is goed te bewaren.
- Wondhelingsperiode in acht nemen.
- Knollen niet te koud bewaren wanneer deze gebruikt gaan worden voor tweede (herfst/winter) teelt.