




Teeltadvies Consumptieteelt Groot-Brittannië

- Zeer goede smaak
- Zeer geschikt voor vroege oogst
- Grove knollen
- Goede opbrengst
- Regelmatige sortering en knolvorm



Landbouwkundige eigenschappen

Rijptijd	75	Midden vroeg
Kiemrust	69	Gemiddeld
Opbrengst rijp	93	Goed
Grofheid	84	Grof
Knolvorm		Ovaal
Knolaantal		9-11
Schilkleur		Licht geel
Vleeskleur na koken		Licht geel
Kooktype		B - iets kruimig
Droge stof/Zetmeel %		18,9% / 13,1%
OWG/Soortelijk gewicht		344 / 1,073
Blauwgevoeligheid	8	Weinig gevoelig
Sencor gevoeligheid	78	● ● ● ● ●
Onderzeeërvorming	45	● ● ● ● ●



Schil- en vleeskleur



Kooktype



Rijptijd

Plantafstanden

Markt: 65-85 mm.

		Rijafstand
Maat	Knollen/ha	75 cm 90 cm

Resistenties

Phytophthora loof	31	● ● ● ● ●
Phytophthora knol	81	● ● ● ● ●
Alternaria	90	● ● ● ● ●
Schurft	63	● ● ● ● ●
Poederschurft	56	● ● ● ● ●
Kringerigheid	79	● ● ● ● ●
Y-virus	30	● ● ● ● ●
Yntn-virus knoltolerantie	99	● ● ● ● ●

Aardappelmoeheid		
Ro1/4 2	● ● ● ● ●	
Ro2/3 *1	● ● ● ● ●	
Ro5 *1	● ● ● ● ●	
Pa2 8	● ● ● ● ●	
Pa3 8	● ● ● ● ●	

Wratziekte		
F1 10	● ● ● ● ●	
F2 3	● ● ● ● ●	
F6 3	● ● ● ● ●	
F18 *1	● ● ● ● ●	


* HZPC eigen meting / Geen officiële meting

Bemesting

- Pas de bemesting aan op basis van de resultaten van de bodemanalyse.
- Nutrient Management Gids (RB209), Groep 1
- Deelgift wordt aanbevolen, 4/5 voor het planten en 1/5 na het planten.
- Organische mest helpt om een gewas vitaal te behouden.
- Organische bemesting heeft een positief effect op de opbrengst.
- PANTHER is gevoelig voor gebreksziekten, daarom bemesten met sporenelementen.
- Extra attentie voor mangaan en magnesium bladbemesting.
- Vloeibare meststoffen met sporenelementen kunnen gecombineerd worden met de phytophthorabespuiting.



Teeltadvies Consumptieteelt Groot-Brittannië




Voorbehandeling en poten

- PANTHER heeft een goede kiemrust.
- Bewaar het pootgoed in de mechanische koeling, om topspruitdominatie te voorkomen.
- Laat het pootgoed voor het poten acclimatiseren.
- Om Rhizoctonia, zilverschurft en andere schimmels te beheersen, worden knol- en/of bodembehandelingen met Azoxystrobine geadviseerd.
- De beste kwaliteit wordt gerealiseerd op vruchtbare en lichte grondsoorten.
- In warme grond planten, niet te vroeg.
- Wanneer geplant wordt op zware kleigrond, is een goede structuur cruciaal.
- Planten in het witte-puntjes-stadium geeft de beste resultaten.




Teelt

- Het gebruik van metribuzin wordt voor opkomst geadviseerd. Gebruik na opkomst het lage doseringssysteem.
- Vanwege hoge kwaliteitseisen wordt beregening sterk geadviseerd.
- Beregening zorgt voor een gelijkmatiger product en een betere kookkwaliteit.
- Houd een strak spuitschema aan, vanwege gevoeligheid voor Phytophthora in loof.



Loofddoding en oogst

- Gebruik een loofddodingsmiddel met een sterke werking op de stengel, om het loslaten van de knol te bevorderen.
- Zorg voor een korte periode tussen loofddoding en oogst om een goede heldere schilkwiteit te behouden.
- Laat voldoende tijd zitten tussen loofddoding en oogst. PANTHER heeft tijd nodig voor een goede afharding.
- PANTHER heeft een dunne schil, besteed extra aandacht aan de huidvastheid.
- PANTHER is weinig gevoelig voor stootblauw. Wees wel alert als er onder extreme omstandigheden gerooid wordt.
- Voorkom mechanische beschadiging, om bewaarbaarheid te verbeteren.



Bewaring

- Product gerooid onder goede omstandigheden, kan na de wondheling snel worden gekoeld.
- PANTHER heeft een lange kiemrust en is goed te bewaren.
- Bewaar veldgewas in de koeling.
- Wondhelingsperiode in acht nemen.
- Bewaartemperatuur: 3 °C.
- Een stabiele temperatuur tijdens de bewaring, voorkomt de uitbreiding van zilverschurft.
- Verlaag de temperatuur 0,5-0,7 °C per dag naar een stabiele waarde, van 3°C-4°C.
- Ventileer kort maar regelmatig om CO2-ophoping te voorkomen.
- Voorkom condensvorming tijdens bewaring.

- **Resistent tegen *Globodera pallida***

