




TRADITIONAL FRESH

- **Buccia lucente, molto invitante**
- **Buona resa**
- **Buon contenuto di sostanza secca**
- **Buona resistenza alla scabbia comune**



Caratteristiche agronomiche

Maturazione	61	Medio-tardiva
Durata della dormienza	96	Molto lunga
Resa	115	Molto alta
Calibro del tubero	82	Grosso
Forma del tubero		Ovale
Numero di tuberi		9-11
Colore della pelle		Gialla
Colore pasta cottura		Giallo
Tipo di cottura		AB - Quasi Soda
Sostanza secca/Amido		19% / 13,2%
Contenuto de sostanza se		346 / 1,074
Inbrunimento interno	15	Moderatamente sensibile
Sens. al Metribuzin	67	●●●●●
Tuberomania	90	●●●●●



Colore della pelle e pasta



Tipo di cottura



Maturazione

Densità di semina

Calibro	Densità di semina/ha	Distanza tra le fila	
		75 cm	90 cm
28/35	53.000	25	21
35/45	48.000	28	23
35/55	44.000	30	25
50/55	40.000	33	28
55/65	38.000	35	29

Profondità di semina: normale.

Controllare sempre il numero di tuberi per un calcolo accurato.

Resistenze

Peronospora fogliame	42	●●●●●
Peronospora del tubero	60	●●●●●
Scabbia comune	61	●●●●●
Scabbia polverulenta	59	●●●●●
Macchie intern.nematodi	97	●●●●●
PVY	18	●●●●●
Yntn tolleranza tubero	99	●●●●●

Res. a nematodi		Res. a Rogna Nera	
Ro1/4	9 ●●●●●	F1	1 ●●●●●
Ro2/3	*1 ●●●●●	F2	*1 ●●●●●
Ro5	*8 ●●●●●	F6	*1 ●●●●●
Pa2	●●●●●	F18	*1 ●●●●●
Pa3	●●●●●		

* Dati interni HZPC / Non testati da un Organo ufficiale

Concimazione

- Adottare un piano di concimazione in relazione ai risultati dell'analisi del terreno.
- Applicare 2/3 prima della semina ed 1/3 alla rincalzatura.
- Azoto (N): Bisogni medi (170-210 kg N/ha inclusa la dotazione del terreno).
- Distribuire quantità di fosforo e potassio seguendo i criteri standard.
- Fare attenzione alla disponibilità di concime organico al fine di evitare una mineralizzazione tardiva.



TRADITIONAL FRESH



Preparazione dei tuberi e semina

- PERDIZ ha una lunga dormienza.
- La pre-germinazione contribuisce ad anticipare la crescita.
- PERDIZ può crescere in tutti i tipi di terreno.
- Può essere piantata quando le gemme sono aperte, ma una buona pre-germogliazione avvantaggia la coltura.




Coltivazione

- L'emergenza è uniforme con un buon sviluppo fogliare.
- Nonostante il ciclo tardivo, PERDIZ ha una tuberizzazione precoce.
- PERDIZ è abbastanza sensibile al metribuzin, usarlo solo in pre-emergenza.
- Attuare un'accurata protezione contro la Phytophthora, per prevenire danni sia al fogliame che sui tuberi.



Maturazione e raccolta

- Assicurarsi che la coltura abbia raggiunto una sufficiente maturità prima del disseccamento. Ciò favorisce un più alto contenuto di sostanza secca.
- I tuberi sono di grandi dimensioni. Raccogliere e conservare con cura per evitare danni e urti.
- La buccia deve essere completamente formata prima della raccolta.
- Prevenire i danni meccanici per migliorare la conservabilità.



Conservazione

- PERDIZ ha una lunga dormienza e buona conservabilità.
- Lavare rapidamente e tenere asciutto per evitare la scabbia argentea.
- Una temperatura stabile durante la conservazione previene lo sviluppo della scabbia argentea.
- Poiché PERDIZ ha una lunga dormienza, al fine della conservazione a lungo termine, le quantità di sostanze inibenti la germinazione possono essere ridotte.