



## France

- **Precocità nel ciclo e nella tuberizzazione**
- **Buccia lucente, molto invitante**
- **Uniformità di calibro e forma dei tuberi**
- **Buona resa**
- **Buona resistenza agli urti**



## Caratteristiche agronomiche

|                          |    |                  |
|--------------------------|----|------------------|
| Maturazione              | 83 | Molto precoce    |
| Resa                     | 97 | Buona            |
| Durata della dormienza   | 46 | Mediamente breve |
| Resa                     | 98 | Mediamente alta  |
| Calibro del tubero       | 81 | Grosso           |
| Forma del tubero         |    | Ovale            |
| Numero di tuberi         |    | 12-14            |
| Colore della pelle       |    | Gialla           |
| Colore pasta cottura     |    | Giallo           |
| Tipo di cottura          |    | A - Soda         |
| Sostanza secca/Amido     |    | 16,7% / 10,9%    |
| Contenuto de sostanza se |    | 298 / 1,063      |
| Inbrunimento interno     | 3  | Non sensibile    |
| Sens. al Metribuzin      | 60 | ● ● ● ● ●        |
| Tuberomania              | 50 | ● ● ● ● ●        |



Colore della pelle e pasta



Tipo di cottura



Maturazione

## Densità di semina

Mercato: 40-65 mm.

| Calibro | Densità di semina/ha | Distanza tra le fila |       |
|---------|----------------------|----------------------|-------|
|         |                      | 75 cm                | 90 cm |
| 28/35   | 48.000               | 25                   | 21    |
| 35/45   | 40.000               | 33                   | 28    |
| 45/50   | 36.000               | 37                   | 31    |
| 50/55   | 32.000               | 42                   | 35    |

Profondità di semina: normale.

Controllare sempre il numero di tuberi per un calcolo accurato.

## Resistenze

|                         |    |           |
|-------------------------|----|-----------|
| Peronospora fogliame    | 24 | ● ● ● ● ● |
| Peronospora del tubero  | 53 | ● ● ● ● ● |
| Alternaria              | 43 | ● ● ● ● ● |
| Scabbia comune          | 62 | ● ● ● ● ● |
| Scabbia pulverulenta    | 59 | ● ● ● ● ● |
| Macchie intern.nematodi | 95 | ● ● ● ● ● |
| PVY                     | 22 | ● ● ● ● ● |
| Yntn tolleranza tubero  | 99 | ● ● ● ● ● |

Res. a nematodi

|       |    |           |
|-------|----|-----------|
| Ro1/4 | 9  | ● ● ● ● ● |
| Ro2/3 | 3  | ● ● ● ● ● |
| Ro5   | *9 | ● ● ● ● ● |
| Pa2   |    | ● ● ● ● ● |
| Pa3   |    | ● ● ● ● ● |

Res. a Rogna Nera

|     |    |           |
|-----|----|-----------|
| F1  | 10 | ● ● ● ● ● |
| F2  | *5 | ● ● ● ● ● |
| F6  | *1 | ● ● ● ● ● |
| F18 | *1 | ● ● ● ● ● |


\* Dati interni HZPC / Non testati da un Organo ufficiale

## Concimazione

- Adottare un piano di concimazione in relazione ai risultati dell'analisi del terreno.
- 
- Azoto (N): Bisogni medi (170-210 kg N/ha inclusa la dotazione del terreno).
- Non usare cloruro di potassio (KCl) prima di 6 settimane dalla semina. Applicazioni tardive possono determinare basso contenuto di sostanza secca.
- Distribuire quantità di fosforo e potassio seguendo i criteri standard.
- PRIMABELLE è suscettibile a carenze di minerali, quindi concimare con microelementi.
- Manganese e magnesio stimolano lo sviluppo di un fogliame robusto e ritardano la senescenza.



## France




### Preparazione dei tuberi e semina

- PRIMABELLE ha corta dormienza.
- Tenere il seme in cella frigorifera per prevenire l'invecchiamento fisiologico e la disidratazione.
- Non togliere il germoglio per prevenire la tuberomania.
- Bene riscaldare il seme. Seminare con un piccolo germoglio bianco.
- Trattare sempre il seme contro la Rhizoctonia.
- La varietà è leggermente sensibile alla tuberomania, quindi occorre piantare in terreni caldi.
- Migliori risultati sono conseguibili ove è possibile ricorrere all'irrigazione.




### Coltivazione

- L'uso del metribuzin è consigliato in pre-emergenza. In caso di post-emergenza, usare un dosaggio inferiore.
- Mantenere un adeguato livello di umidità del suolo per ottenere un prodotto di qualità.
- Limitare gli apporti irrigui nella seconda parte della stagione per stimolare l'accumulo di sostanza secca.
- Attuare un'accurata protezione contro la Phytophthora, per prevenire danni al fogliame.
- Nella fase finale del ciclo vegetativo, usare prodotti in grado di proteggere i tuberi.



### Maturazione e raccolta

- Cercare di ottenere un contenuto di sostanza secca del 17 %.
- PRIMABELLE può essere raccolta dopo 90-100 giorni.
- In caso di disseccamento del fogliame, attendere almeno tre settimane prima della raccolta.
- In aree precoci, in caso di disseccamento del fogliame, attendere almeno due settimane prima della raccolta.
- PRIMABELLE è abbastanza resistente agli urti, a meno che non si verifichino condizioni estreme.
- Effettuare la raccolta solo quando le condizioni del suolo sono ottimali.



### Conservazione

- PRIMABELLE è una varietà precoce e quindi le vendite avvengono entro 5 mesi dopo la raccolta.
- Con una gestione adeguata del stoccaggio, PRIMABELLE è adatta per una lunga conservazione.
- Per una conservazione di 6 mesi, si raccomanda, dopo la raccolta, di ridurre rapidamente la temperatura a 4°C.
- Temperatura di conservazione: 4 °C.
- Ridurre la temperatura di 0,5 - 0,7 gradi al giorno fino ad un valore stabile di 3° - 4° C.
- Ventilare regolarmente, ma per tempi brevi, per evitare l'accumulo di CO2.
- Qualsiasi variazione di temperatura, combinata con la presenza di condensa, può portare ad una germinazione precoce e a un elevato rischio di scabbia argentea.
- Per una lunga conservazione, è necessario usare un inibitore della germogliazione.