



Teeltadvies Consumptieteelt Frankrijk

- Vroege rijptijd met een vroege knolzetting
- Erg mooie heldere schil
- Regelmatige sortering en knolvorm
- Goede opbrengst
- Weinig gevoelig voor stootblauw



Landbouwkundige eigenschappen

Rijptijd	83	Zeer vroeg
Opbrengst groen	97	Gemiddeld
Kiemrust	46	Vrij kort
Opbrengst rijp	98	Vrij hoog
Grofheid	81	Grof
Knolvorm		Ovaal
Knolaantal		12-14
Schilkleur		Geel
Vleeskleur na koken		Geel
Kooktype		A - Vastkokend
Droge stof/Zetmeel %		16,7% / 10,9%
OWG/Soortelijk gewicht		298 / 1,063
Blauwgevoeligheid	3	Niet gevoelig
Sencor gevoeligheid	60	● ● ● ● ●
Onderzeeërvorming	50	● ● ● ● ●



Schil- en vleeskleur



Kooktype



Rijptijd

Plantafstanden

Markt: 40-65 mm.

Maat	Knollen/ha	Rijafstand	
		75 cm	90 cm
28/35	48.000	25	21
35/45	40.000	33	28
45/50	36.000	37	31
50/55	32.000	42	35

Plantdiepte: standaard, maaivelddiepte.

Controleer altijd het knolaantal voor een juiste berekening.

Resistenties

Phytophthora loof	24	● ● ● ● ●
Phytophthora knol	53	● ● ● ● ●
Alternaria	43	● ● ● ● ●
Schurft	62	● ● ● ● ●
Poederschurft	59	● ● ● ● ●
Kringerigheid	95	● ● ● ● ●
Y-virus	22	● ● ● ● ●
Yntn-virus knoltolerantie	99	● ● ● ● ●

Aardappelmoeheid		
Ro1/4 9	● ● ● ● ●	
Ro2/3 3	● ● ● ● ●	
Ro5 *9	● ● ● ● ●	
Pa2	● ● ● ● ●	
Pa3	● ● ● ● ●	

Wratziekte		
F1 10	● ● ● ● ●	
F2 *5	● ● ● ● ●	
F6 *1	● ● ● ● ●	
F18 *1	● ● ● ● ●	


* HZPC eigen meting / Geen officiële meting

Bemesting

- Pas de bemesting aan op basis van de resultaten van de bodemanalyse.
- Raadpleeg altijd de lokale en huidige regels over gewasbemesting.
- Stikstof (N) : Normale dosering (170-210Kg N/ha inclusief bodemvoorraad)
- Chloorkali (KCl) niet minder dan 6 weken voor het planten toepassen, late toediening kan een lager drogestofgehalte veroorzaken.
- Fosfaat (P) en Kalium (K) : volgens standaard advies.
- PRIMABELLE is gevoelig voor gebreksziekten, daarom bemesten met sporenelementen.
- Extra attentie voor mangaan en magnesium bladbemesting.



Teeltadvies Consumptieteelt Frankrijk



Voorbehandeling en poten

- PRIMABELLE heeft een korte kiemrust.
- Bewaar pootgoed in de mechanische koeling, om fysiologische ouderdom te voorkomen.
- Niet afkiemen om onderzeeërvorming te voorkomen.
- Warm het pootgoed op en plant de knollen met witte puntjes.
- Behandel PRIMABELLE pootgoed altijd tegen Rhizoctonia.
- Het ras is gevoelig voor onderzeeërvorming. Niet planten in koude grond.
- Irrigatie wordt geadviseerd




Teelt

- Het gebruik van metribuzin wordt voor opkomst geadviseerd. Gebruik na opkomst het lage doseringssysteem.
- Behoud een goed niveau van bodemvocht voor een goede opbrengst en kwaliteit.
- Beperk beregening in de 2e helft van het groeiseizoen, om drogestofopbouw te stimuleren.
- Houd een strak spuitschema aan, vanwege gevoeligheid voor Phytophthora in loof.
- Gebruik later in het seizoen middelen met een goede knolbescherming.



Loofdding en oogst

- Streef naar een onderwatergewicht van 305 gram.
- PRIMABELLE kan geoogst worden na 90-100 dagen.
- Minimaal 3 weken tussen loofdding en rooien voor een goede huidvastheid.
- Voor de vroege eeltgebeden: Houdt minimaal 2 weken aan tussen doodmaken en oogsten.
- PRIMABELLE is weinig gevoelig voor stootblauw. Wees wel alert als er onder extreme omstandigheden gerooid wordt.
- Rooi alleen wanneer bodemcondities optimaal zijn.



Bewaring

- PRIMABELLE is een vroeg ras. De afzet vindt meestal binnen 5 maanden na de oogst plaats.
- Met het juiste bewaarregime, is PRIMABELLE geschikt voor de lange bewaring.
- Na de oogst: verlaag snel de bewaartemperatuur tot 4 graden. Op deze manier kunnen de aardappelen 6 maanden bewaard blijven.
- Bewaartemperatuur: 4 °C.
- Verlaag de temperatuur 0,5-0,7 °C per dag naar een stabiele waarde, van 3°C-4°C.
- Ventileer kort maar regelmatig om CO2-ophoping te voorkomen.
- Elke temperatuurschommeling gecombineerd met condens kan resulteren in vroege kieming en een hoog risico op zilverscurft.
- Voor lange bewaring moet gebruik worden gemaakt van kiemremmers.