PRIMABELLE

CARRERA X AGATA

Produção de batata de consumo France

- **Maturação e tuberização precoces**
- **Pele bastante atrativa e brilhante**
- **Calibre e forma dos tubérculos uniformes**
- **Boa produção**
- **Boa tolerância a golpes**



Propriedades agronómicas

Maturação	83	Miuito precoce
Rendimento precoce	97	Medio
Periodo de dormencia	46	Moderadamente curto
Produto final maturação	98	Moderado alto
Tamanho tubérculos	81	Grande calibre
Forma dos tubérculos		Oval
Numero de tubérculos		12-14
Cor da pele		Amarela
Polpa após cozinhar		Amarela
Tipo culinário		A - Firme
Peso de matéria seca/Aln		16,7% / 10,9%
Teor de matéria seca/Pes		298 / 1,063
Enegrecimento interno	3	Não sensível
Sens. ao Metribuzin	60	
Formacao de Batatinhas	50	

Cor da pele e carne

Tipo culinário

Maturação

Densidade de Plantação

Mercado: 40-65 mm.

Calibre	Densidade de plantação/ha	Distancia entre linhas 75 cm	90 cm
28/35	48.000	25	21
35/45	40.000	33	28
45/50	36.000	37	31
50/55	32.000	42	35

Profundidade de plantação: normal.
Verificar sempre a contagem de tubérculos para um cálculo correto.

Resistências

Mildio da folha	24	
Mildio do tuberculo	53	
Alternaria	43	
Sarna comum	62	
Sarna pulvurolenta	59	
Spraing	95	
PVY	22	
Yntn tolerancia tubérculos	99	

Res. aos nematodos		Res. verruga	
Ro1/4	9	F1	10
Ro2/3	3	F2	*5
Ro5	*9	F6	*1
Pa2		F18	*1
Pa3			

* HZPC own analysis/no official analysis

Fertelização

- Adaptar a fertilização em função das análises do solo.
-
- Azoto (N): Aplicação média (170-210Kg N/Ha incluindo a disponibilidade no solo).
- Não aplicar Potássio Clorídrico (KCl) menos de 6 semanas antes da plantação, aplicações tardias podem induzir níveis mais baixos de matéria seca.
- Adubação com Potássio e Fosfatos de acordo com a recomendação padrão.
- PRIMABELLE é suscetível à deficiência de minerais, por essa razão planear antecipadamente a fertilização.
- O Manganês e o Magnésio fortalecem a folhagem e previnem a morte prematura.

HZPC não assume responsabilidade por quaisquer consequências prejudiciais que possam eventualmente occorrer quando utilizar esta informação 24 Jan 2025

www.hzpc.com

Pour toutes informations complémentaires contacter votre interlocuteur habituel ou nos bureau au 03 62 13 81 24 ou par E-mail : accueil@hzpc.com

PRIMABELLE

CARRERA X AGATA

Produção de batata de consumo France



Preparação e Plantação

- PRIMABELLE tem uma dormência curta.
- Manter a semente em câmara frigorífica para prevenir o envelhecimento fisiológico e a desidratação.
- "Não desgrelar para evitar a ""formação de batatinhas""."
- Aquecer corretamente a semente e plantar com pequenos grelos brancos.
- Tratar sempre as sementes de PRIMABELLE e o solo contra Rhizoctonia.
- A variedade tem uma ligeira suscetibilidade à formação de batatinhas, evitar plantar em solos muito frios.
- Preferência de cultivo com irrigação.

Cultivo

- Recomenda-se a utilização de Metribuzina em pré-emergência. Em caso de pós-emergência, utilizar doses mais baixas.
- Mantenha a humidade adequada do solo para um bom rendimento e qualidade.
- Limitar a irrigação numa segunda fase da cultura para estimular a acumulação de matéria seca.
- Utilizar um plano de tratamentos, devido ao elevado risco do Míldio da folha.
- Utilizar, mais tarde durante o cultivo, produtos com uma forte proteção contra o Míldio do tubérculo.

Defenagem e Colheita

- Para obter teor de matéria seca de 17%.
- O arranque do PRIMABELLE pode ser feito após 90-100 dias.
- Mínimo de 3 semanas entre a desecagem das plantas e o arranque para ter uma pele completamente firme.
- Nas áreas iniciais : mínimo de 3 semanas entre a desecagem das plantas e o arranque para ter uma pele completamente firme.
- PRIMABELLE é muito resistente a golpes, exceto em condições extremas.
- Proceda ao arranque quando as condições do solo forem otimas.



Armazenamento

- PRIMABELLE é uma variedade precoce, pelo que a sua comercialização ocorre normalmente nos 5 meses subsequentes à sua colheita.
- Com as corretas condições, PRIMABELLE é adequada para armazenar longo periodo de tempo
- Após o arranque, baixar rapidamente a temperatura para 4°C. Apropriada para armazenamento longo até 6 meses.
- Temperatura de armazenamento: 4 ºC.
- Reduzir a temperatura 0,5 ºC-0,7 ºC por dia, até um valor estável entre 3 ºC e 4 ºC.
- Ventilar com regularidade para evitar acumulação de CO2.
- Qualquer alteração da temperatura, em combinação com condensação, pode resultar num abrolhamento precoce e num elevado risco de aparecimento de Sarna prateada.
- Para um armazenamento a longo prazo, é necessário usar anti-abrolhantes.

HZPC não assume responsabilidade por quaisquer consequências prejudiciais que possam eventualmente occorrer quando utilizar esta informação 24 Jan 2025

www.hzpc.com

Pour toutes informations complémentaires contacter votre interlocuteur habituel ou nos bureau au 03 62 13 81 24 ou par E-mail : accueil@hzpc.com