




Teeltadvies Consumptieteelt FRENCH FRIES

- Grove knollen
- Regelmatige sortering en knolvorm
- Goed drogestofgehalte
- Hoge resistentie tegen kringerigheid



Landbouwkundige eigenschappen

Rijptijd	66	Midden vroeg
Kiemrust	76	Lang
Opbrengst rijp	104	Vrij hoog
Grofheid	83	Grof
Knolvorm		Ovaal / Lang-ovaal
Knolaantal		9-11
Schilkleur		Geel
Vleeskleur na koken		Licht geel
Kooktype		B - iets kruimig
Droge stof/Zetmeel %		21,7% / 15,8%
OWG/Soortelijk gewicht		400 / 1,086
Blauwgevoeligheid	17	Gevoelig
Sencor gevoeligheid	73	● ● ● ● ●
Onderzeeërvorming	83	● ● ● ● ●



Schil- en vleeskleur



Kooktype



Rijptijd

Plantafstanden

Maat	Knollen/ha	Rijafstand	
		75 cm	90 cm
28/35	45.000	30	25
35/50	38.000	35	29
50/60	36.000	37	31
50/60 gesneden	40.000	33	28

Plantdiepte: standaard, maaivelddiepte.

Plantaantal heeft een sterke invloed op de grofheid.

Resistenties

Phytophthora loof	52	● ● ● ● ●
Phytophthora knol	74	● ● ● ● ●
Alternaria	59	● ● ● ● ●
Schurft	69	● ● ● ● ●
Poederschurft	63	● ● ● ● ●
Kringerigheid	98	● ● ● ● ●
Y-virus	99	● ● ● ● ●
Yntn-virus knoltolerantie	99	● ● ● ● ●

Aardappelmoeheid

Ro1/4	9	● ● ● ● ●
Ro2/3	4	● ● ● ● ●
Ro5		● ● ● ● ●
Pa2	*1	● ● ● ● ●
Pa3		● ● ● ● ●

Wratziekte

F1	10	● ● ● ● ●
F2	1	● ● ● ● ●
F6	*1	● ● ● ● ●
F18	*1	● ● ● ● ●

* HZPC eigen meting / Geen officiële meting

Bemesting

- Deelgift wordt aanbevolen, 4/5 voor het planten en 1/5 na het planten.
- Stikstof (N) : 210-250 kg N/ha inclusief bodemvoorraad.
- Chloorkali (KCl) niet minder dan 6 weken voor het planten toepassen, late toediening kan een lager drogestofgehalte veroorzaken.
- Kali (K): circa 350 kg K/ha
- Een verse kaligift wordt aangeraden om blauw te voorkomen.
- QUINTERA is gevoelig voor magnesiumtekort, aanvullende magnesiumbemesting wordt geadviseerd



Teeltadvies Consumptieteelt FRENCH FRIES



Voorbehandeling en poten

- QUINTERA heeft een lange kiemrust.
- Maatregelen om de teelt te vervroegen zijn aan te bevelen.
- Laat het pootgoed voor het poten acclimatiseren.
- Bewaar het pootgoed niet kouder dan 5 °C. Warm voldoende op voor het poten.
- Behandel QUINTERA pootgoed en de grond tegen Rhizoctonia.
- QUINTERA kan worden geteeld op alle grondsoorten, ook onder omstandigheden waar weinig water beschikbaar is.
- Wanneer geplant wordt op zware kleigrond, is een goede structuur cruciaal.
- Zorg voor een goede rugopbouw om groene knollen te voorkomen.




Teelt

- QUINTERA heeft een vroege knolzetting.
- Het gebruik van metribuzin wordt voor opkomst geadviseerd. Gebruik na opkomst het lage doseringssysteem.
- Preventieve behandeling tegen Phytophthora wordt geadviseerd.



Loofdoding en oogst

- QUINTERA heeft een vroege afrijping. Loofvernietiging zal geen problemen geven.
- Als melaïne hydrazyde wordt gebruikt, dient het toegepast te worden wanneer de kleinste knol 28 mm is en het loof nog groen is.
- QUINTERA is vrij gevoelig voor stootblauw en rooibeschatiging. Beperk de valhoogte en voorkom mechanische beschadiging.
- Oogst QUINTERA voorzichtig. Bij een hoge OWG neemt de kans op blauwgevoeligheid toe.
- Beperk de snelheid van de rooimat en valhooftes om mechanische rooischade te voorkomen.



Bewaring

- Wondhelingsperiode in acht nemen.
- Bewaren bij een stabiele temperatuur van 8 °C.
- Ventileer regelmatig om rot in de box te voorkomen.
- QUINTERA heeft een lange kiemrust. Kiemremmingmiddelen zijn alleen nodig voor late leveringen.