




Teeltadvies Consumptieteelt TRADITIONAL FRESH

- Zeer mooie heldere schil
- Hoge opbrengst
- Goed drogestofgehalte
- Geschikt voor (thuis)frites
- Goede resistentie tegen schurft en poederschurft



Landbouwkundige eigenschappen

Rijptijd	57	Midden laat
Kiemrust	66	Gemiddeld
Opbrengst rijp	119	Zeer hoog
Grofheid	86	Zeer grof
Knolvorm		Ovaal
Knolaantal		9-11
Schilkleur		Geel
Vleeskleur na koken		Geel
Kooktype		AB - Vrij vastkokend
Droge stof/Zetmeel %		19,1% / 13,3%
OWG/Soortelijk gewicht		348 / 1,074
Blauwgevoeligheid	16	Gevoelig
Sencor gevoeligheid	73	● ● ● ● ●
Onderzeeërvorming	75	● ● ● ● ●



Schil- en vleeskleur



Kooktype



Rijptijd

Plantafstanden

Maat	Knollen/ha	Rijafstand	
		75 cm	90 cm
28/35	50.000	27	22
35/45	44.000	30	25
35/55	42.000	32	26
50/55	39.000	34	28
55/65	36.000	37	31

Plantdiepte: standaard, maaivelddiepte.

Controleer altijd het knolaantal voor een juiste berekening.

Resistenties

Phytophthora loof	53	● ● ● ● ●
Phytophthora knol	62	● ● ● ● ●
Alternaria	70	● ● ● ● ●
Schurft	73	● ● ● ● ●
Poederschurft	66	● ● ● ● ●
Kringerigheid	91	● ● ● ● ●
Y-virus	17	● ● ● ● ●
Yntn-virus knoltolerantie	99	● ● ● ● ●

Aardappelmoetheid

Ro1/4	9	● ● ● ● ●
Ro2/3	3	● ● ● ● ●
Ro5	*1	● ● ● ● ●
Pa2		● ● ● ● ●
Pa3		● ● ● ● ●

Wratziekte

F1	*3	● ● ● ● ●
F2	*5	● ● ● ● ●
F6	*5	● ● ● ● ●
F18	*1	● ● ● ● ●

* HZPC eigen meting / Geen officiële meting

Bemesting

- Pas de bemesting aan op basis van de resultaten van de bodemanalyse.
- Raadpleeg altijd de lokale en huidige regels over gewasbemesting.
- Deelgift wordt aanbevolen, 2/3 voor het planten en 1/3 na knolzetting.
- Stikstof (N) : Normale dosering (170-210Kg N/ha inclusief bodemvoorraad)
- Fosfaat (P) en Kalium (K) : volgens standaard advies.



Teeltadvies Consumptieteelt **TRADITIONAL FRESH**



Voorbehandeling en poten

- RASHIDA heeft een gemiddelde kiemrust.
- Laat het pootgoed voor het poten acclimatiseren.
- RASHIDA is geschikt voor alle grondsoorten.
- Zorg voor een goede rugopbouw om groene knollen te voorkomen.




Teelt

- De opkomst is gelijkmatig, met een goede loofontwikkeling.
- RASHIDA heeft een goede tolerantie tegen metribuzin.
- Houd een strak spuitschema aan, vanwege gevoeligheid voor Phytophthora in loof.



Loofdding en oogst

- Zorg voor een goed afgerijpt gewas, om het drogestofgehalte te vergroten.
- Een niet afgeharde schil heeft een negatieve invloed op de bewaring.
- RASHIDA is vrij gevoelig voor stootblauw en rooibeschatiging. Beperk de valhoogte en voorkom mechanische beschadiging.



Bewaring

- RASHIDA heeft een goede kiemrust, luchtkoeling kan worden gebruikt voor de eerste maanden na de oogst.
- Goede bewaarbaarheid bij constante temperatuur.