



Producción de consumo TRADITIONAL FRESH

- **Maduración y tuberización temprana**
- **Tubérculos grandes**
- **Buena producción**
- **Tubérculo de calibre y forma uniformes**
- **Buena calidad culinaria**



Propiedades agronómicas

Maduración	76	Temprana
Producción	96	Media
Período de dormencia	54	Algo corto
Producción	96	Bien
Tamaño del tuberculo	80	Calibre grande
Forma		Oval / Alargada-oval
Número de tubérculos		9-11
Color de piel		Roja
Color carne cocinar		Amarilla
Tipo de cocion		AB - Ligeramente firme
Materia seca/Almidon %		18,3% / 12,5%
/Peso específico		332 / 1,07
Golpeo interno	10	Algo sensible
Sens. Metribuzin	64	● ● ● ● ●
Fenómeno patatitas	75	● ● ● ● ●



Color de piel y carne



Tipo de cocion



Maduración

Densidad de plantación

Calibre	Densidad de plantación/ha	Distancia entre caballones	
		75 cm	90 cm
28/35	50.000	27	22
35/45	46.000	29	24
35/55	43.000	31	26
50/55	39.000	34	28
55/65	36.000	37	31

Resistencias

Mildíu en planta	43	● ● ● ● ●
Mildíu en el tubérculo	51	● ● ● ● ●
Alternaria	69	● ● ● ● ●
Sarna común	57	● ● ● ● ●
Sarna verrugosa	59	● ● ● ● ●
Spraing	75	● ● ● ● ●
Virus Y	22	● ● ● ● ●
Tol. Yntn tubérculo	81	● ● ● ● ●

Res. a nemátodos		Roña	
Ro1/4 9	● ● ● ● ●	F1 10	● ● ● ● ●
Ro2/3 *3	● ● ● ● ●	F2 3	● ● ● ● ●
Ro5 *2	● ● ● ● ●	F6	● ● ● ● ●
Pa2	● ● ● ● ●	F18	● ● ● ● ●
Pa3	● ● ● ● ●		

* Datos internos de HZPC / No probado por un Organismo oficial

Fertilización

- Adaptar el abonado a los análisis del suelo.
- Consulte siempre las normas locales vigentes sobre fertilización de cultivos.
- El nitrógeno puede aplicarse en una dosis. Esto ayuda a adelantar la cosecha.
- Se aconseja la aplicación fraccionada para mantener la planta vigorosa y obtener unos tubérculos más grandes.
- Nitrógeno (N): aporte muy alto (>250Kg N/Ha incluido las reservas del suelo).



Producción de consumo TRADITIONAL FRESH




Cultivo

- Antes de la plantación, permitir que la semilla se aclimate a las condiciones locales.
- RED SCARLETT reacciona bien al cortar la semilla de calibre gordo. Da mejores resultados cuando se hace 3-4 semanas antes de la plantación.
- Se recomienda tratar el tubérculo o el suelo contra rizoctonia, sarna plateada y otras enfermedades de la piel. Azoxystrobin en el suelo da buenos resultados contra hongos.
- RED SCARLETT se puede cultivar en todo tipo de suelos.
- Puede plantarse con pequeñas yemas blanquecinas, pero una buena prebrotación puede adelantar la cosecha.




Período de cultivo

- La emergencia es uniforme, con un buen desarrollo de la planta.
- RED SCARLETT es muy sensible a metribuzin, usarlo solo en preemergencia.
- Utilizar tratamientos estrictos contra Phytophthora, ya que es muy susceptible en planta y tubérculo.
- RED SCARLETT es sensible a Alternaria. Comenzar los tratamientos en el momento de la floración.
- Usar productos que tengan efecto en Alternaria solani y Alternaria alternata.
- Se aconsejan pulverizaciones preventivas contra Phytophthora.



Destrucción de las plantas

- La piel debe estar totalmente fijada antes de la cosecha.
- RED SCARLETT es muy resistente al golpeo, a menos que se produzcan condiciones extremas.
- Evitar especialmente los daños mecánicos para prevenir infecciones posteriores por Fusarium.



Almacenamiento

- Es esencial una buena curación, ya que RED SCARLETT es ligeramente susceptible a Fusarium.
- RED SCARLETT es ligeramente susceptible a Phoma, prestar atención a la curación de la piel. Una bajada brusca de temperatura aumentará el riesgo de Phoma.
- Para períodos de almacenamiento superiores a tres meses, se requiere refrigeración.
- Ventilar de forma regular pero breve para prevenir la acumulación de CO2.
- Cualquier fluctuación de temperatura combinada con condensaciones, puede dar lugar a brotaciones tempranas y un elevado riesgo a sarna plateada.