



Teeltadvies Consumptieteelt TRADITIONAL FRESH

- Vroege rijptijd met vroege knolzetting
- Grove knollen
- Goede opbrengst
- Regelmatige sortering en knolvorm
- Goede kookkwaliteit



Landbouwkundige eigenschappen

Rijptijd	76	Vroeg
Kiemrust	54	Vrij kort
Opbrengst groen	96	Gemiddeld
Opbrengst rijp	96	Goed
Grofheid	80	Grof
Knolvorm		Ovaal / Lang-ovaal
Knolaantal		9-11
Schilkleur		Rood
Vleeskleur na koken		Geel
Kooktype		AB - Vrij vastkokend
Droge stof/Zetmeel %		18,3% / 12,5%
OWG/Soortelijk gewicht		332 / 1,07
Blauwgevoeligheid	10	Weinig gevoelig
Sencor gevoeligheid	64	● ● ● ● ●
Onderzeeërvorming	75	● ● ● ● ●



Schil- en vleeskleur



Kooktype



Rijptijd

Plantafstanden

Maat	Knollen/ha	Rijafstand	
		75 cm	90 cm
28/35	50.000	27	22
35/45	46.000	29	24
35/55	43.000	31	26
50/55	39.000	34	28
55/65	36.000	37	31

Resistenties

Phytophthora loof	43	● ● ● ● ●
Phytophthora knol	51	● ● ● ● ●
Alternaria	69	● ● ● ● ●
Schurft	57	● ● ● ● ●
Poederschurft	59	● ● ● ● ●
Kringerigheid	75	● ● ● ● ●
Y-virus	22	● ● ● ● ●
Yntn-virus knoltolerantie	81	● ● ● ● ●

Aardappelmoetheid

Ro1/4	9	● ● ● ● ●
Ro2/3	*3	● ● ● ● ●
Ro5	*2	● ● ● ● ●
Pa2		● ● ● ● ●
Pa3		● ● ● ● ●

Wratziekte

F1	10	● ● ● ● ●
F2	3	● ● ● ● ●
F6		● ● ● ● ●
F18		● ● ● ● ●

* HZPC eigen meting / Geen officiële meting

Bemesting

- Pas de bemesting aan op basis van de resultaten van de bodemanalyse.
- Raadpleeg altijd de lokale en huidige regels over gewasbemesting.
- Stikstof in 1 keer toedienen voor een vroege beginontwikkeling.
- Een gedeelte gift wordt geadviseerd voor een vitaal gewas, dit zal resulteren in grovere knollen.
- Stikstof (N) : Erg hoge dosering (>250Kg N/ha inclusief bodemvoorraad)



Teeltadvies Consumptieteelt TRADITIONAL FRESH



Voorbehandeling en poten

- Laat het pootgoed voor het poten acclimatiseren.
- RED SCARLETT reageert goed op het snijden van de grote potmaat. Het beste resultaat wordt verkregen bij 3-4 weken voor het planten.
- Om Rhizoctonia, zilverschurft en andere schimmels te beheersen, worden knol- en/of bodembehandelingen met Azoxystrobin geadviseerd.
- RED SCARLETT is geschikt voor alle grondsoorten.
- Kan worden geplant in het witte puntjes stadium. Voorkiemen kan de teelt vervroegen.




Teelt

- De opkomst is gelijkmatig, met een goede loofontwikkeling.
- RED SCARLETT is gevoelig voor metribuzin, kan alleen voor opkomst gespoten worden.
- Houd een strak spuitschema aan, vanwege gevoeligheid voor Phytophthora in loof en knol.
- RED SCARLETT is gevoelig voor Alternaria. Start de gewasbescherming rond de bloeiperiode.
- Gebruik producten die effect hebben op Alternaria solani en alternata.
- Preventieve behandeling tegen Phytophthora wordt geadviseerd.



Loofdoding en oogst

- De schil moet volledig zijn afgehard voordat er kan worden geoogst.
- RED SCARLETT is weinig gevoelig voor stootblauw. Wees wel alert als er onder extreme omstandigheden gerooid wordt.
- Beperk zoveel mogelijk mechanische beschadiging om Fusarium te voorkomen.



Bewaring

- Goede wondheling is essentieel omdat RED SCARLETT vrij gevoelig is voor Fusarium.
- RED SCARLETT is licht gevoelig voor Phoma. Let op de wondheling. Een snelle temperatuurdaling verhoogt het risico op Phoma.
- Voor bewaring langer dan 3 maanden is mechanische koeling vereist.
- Ventileer kort maar regelmatig om CO₂-ophoping te voorkomen.
- Elke temperatuurschommeling gecombineerd met condens kan resulteren in vroege kieming en een hoog risico op zilverschurft.