



Producción de consumo TRADITIONAL FRESH

- Buena producción
- Tubérculo de calibre y forma uniformes
- Piel roja oscura brillante
- Alto contenido de materia seca
- Buena calidad culinaria



Propiedades agronómicas

Maduración	55	Tardia
Producción	107	Alta
Período de dormencia	61	Medio
Producción	109	Alta
Tamaño del tuberculo	80	Calibre grande
Forma		Oval / Alargada-oval
Número de tubérculos		12-14
Color de piel		Roja
Color carne cocinar		Amarilla clara
Tipo de cocion		B - Ligeramente harinos
Materia seca/Almidon %		22% / 16,1%
/Peso específico		406 / 1,087
Golpeo interno	12	Bastante sensible
Sens. Metribuzin	82	● ● ● ● ●
Fenómeno patatitas	79	● ● ● ● ●



Color de piel y carne



Tipo de cocion



Maduración

Densidad de plantación

Calibre comercial: 28-55 mm.

Calibre	Densidad de plantación/ha	Distancia entre caballones	
		75 cm	90 cm
28/35	45.000	30	25
35/45	42.000	32	26
35/55	40.000	33	28
50/55	37.000	36	30
55/65	35.000	38	32

Resistencias

Mildíu en planta	55	● ● ● ● ●
Mildíu en el tubérculo	57	● ● ● ● ●
Alternaria	81	● ● ● ● ●
Sarna común	56	● ● ● ● ●
Sarna verrugosa	54	● ● ● ● ●
Spraing	72	● ● ● ● ●
Virus Y	17	● ● ● ● ●
Tol. Yntn tubérculo	94	● ● ● ● ●

Res. a nemátodos		Roña
Ro1/4 *2	● ● ● ● ●	F1 10 ● ● ● ● ●
Ro2/3 *1	● ● ● ● ●	F2 ● ● ● ● ●
Ro5 *1	● ● ● ● ●	F6 ● ● ● ● ●
Pa2 *1	● ● ● ● ●	F18 ● ● ● ● ●
Pa3 *1	● ● ● ● ●	

* Datos internos de HZPC / No probado por un Organismo oficial

Fertilización

- Adaptar el abonado a los análisis del suelo.
- Nitrógeno (N): aporte medio (170-210Kg N/Ha incluido las reservas del suelo).
- Fertilización con potasio y fosfato como recomendación general.



Producción de consumo **TRADITIONAL FRESH**



Cultivo

- No es necesaria la prebrotación.
- Evitar terrenos con alto riesgo a sarna pulverulenta o sarna común.
- Cuando se planta en terrenos duros resulta crucial una buena estructura.
- Tomar la precaución de hacer buenos caballones para evitar el verdeamiento.
- Puede plantarse con pequeñas yemas blanquecinas, pero una buena prebrotación puede adelantar la cosecha.
- Los tubérculos crecen bastante profundos y esparcidos por el caballón.




Período de cultivo

- La emergencia es uniforme, con un buen desarrollo de la planta.
- Intentar mantener una buena humedad en el terreno para prevenir la sarna común.
- A pesar de su buena resistencia contra Phytophthora, se aconsejan aplicaciones preventivas en ciclos de cultivo largos.



Destrucción de las plantas

- La destrucción de la planta necesita de una especial atención, especialmente con niveles altos de nitrógeno.
- Asegurarse de que el cultivo esté maduro en el momento de la destrucción de la planta.
- RODEO tuberiza por todo el caballón, por lo que hay que tener cuidado durante la cosecha.
- La piel debe estar totalmente fijada antes de la cosecha.
- RODEO es moderadamente susceptible al golpeo. Reducir caídas de altura y evitar los daños mecánicos.



Almacenamiento

- Secar rápidamente y mantener el producto seco para evitar la sarna plateada.
- Unas temperaturas estables durante el almacenamiento evitan el desarrollo de sarna plateada.