



TRADITIONAL FRESH

- Buona resa
- Uniformità di calibro e di forma dei tuberi
- Buccia lucente rosso scura
- Varietà con contenuto elevato di sostanza secca
- Buona qualità di cottura



Caratteristiche agronomiche

Maturazione	55	Tardiva
Resa	107	Alta
Durata della dormienza	61	Moderata
Resa	109	Alta
Calibro del tubero	80	Grosso
Forma del tubero		Ovale / Lunga-ovale
Numero di tuberi		12-14
Colore della pelle		Rossa
Colore pasta cotta		Giallo chiaro
Tipo di cottura		B - Quasi farinosa
Sostanza secca/Amido		22% / 16,1%
Contenuto de sostanza se		406 / 1,087
Inbrunimento interno	12	Moderatamente sensibile
Sens. al Metribuzin	82	●●●●●
Tuberomania	79	●●●●●



Colore della pelle e pasta



Tipo di cottura



Maturazione

Densità di semina

Mercato: 28-55 mm.

Calibro	Densità di semina/ha	Distanza tra le fila	
		75 cm	90 cm
28/35	45.000	30	25
35/45	42.000	32	26
35/55	40.000	33	28
50/55	37.000	36	30
55/65	35.000	38	32

Resistenze

Peronospora fogliame	55	●●●●●
Peronospora del tubero	57	●●●●●
Alternaria	81	●●●●●
Scabbia comune	56	●●●●●
Scabbia pulverulenta	54	●●●●●
Macchie intern.nematodi	72	●●●●●
PVY	17	●●●●●
Yntn tolleranza tubero	94	●●●●●

Res. a nematodi

Ro1/4 *2	●●●●●
Ro2/3 *1	●●●●●
Ro5 *1	●●●●●
Pa2 *1	●●●●●
Pa3 *1	●●●●●

Res. a Rogna Nera

F1 10	●●●●●
F2	●●●●●
F6	●●●●●
F18	●●●●●

* Dati interni HZPC / Non testati da un Organo ufficiale

Concimazione

- Adottare un piano di concimazione in relazione ai risultati dell'analisi del terreno.
-
- Azoto (N): Bisogni medi (170-210 kg N/ha inclusa la dotazione del terreno).
- Distribuire quantità di fosforo e potassio seguendo i criteri standard.



TRADITIONAL FRESH



Preparazione dei tuberi e semina

- La pre-germogliazione non è necessaria.
- Evitare terreni con alto rischio di scabbia polverulenta.
- Quando si semina in un terreno pesante, è fondamentale avere una buona struttura.
- Effettuare una buona rincalzatura per evitare la presenza di tuberi verdi.
- Può essere piantata quando le gemme sono aperte, ma una buona pre-germogliazione avvantaggia la coltura.
- I tuberi crescono alquanto in profondità e sono distribuiti nello spazio della fila.




Coltivazione

- L'emergenza è uniforme con un buon sviluppo fogliare.
- Mantenere una buona umidità del terreno per evitare infezioni da scabbia comune.
- Nonostante la buona resistenza alla Phytophthora, un trattamento preventivo regolare è consigliato data la lunga stagione di crescita.



Maturazione e raccolta

- Il disseccamento del fogliame richiede attenzione, specialmente in condizioni di alto livello di azoto.
- Assicurarci che la coltura sia matura al momento del disseccamento.
- RODEO cresce in tutto il volume della fila, fare attenzione durante la scavatura.
- La buccia deve essere completamente formata prima della raccolta.
- RODEO è moderatamente suscettibile agli urti. Ridurre l'altezza di caduta ed evitare danni meccanici.



Conservazione

- Lavare rapidamente e tenere asciutto per evitare la scabbia argentea.
- Una temperatura stabile durante la conservazione previene lo sviluppo della scabbia argentea.