



Teeltadvies Consumptieteelt TRADITIONAL FRESH

- Goede opbrengst
- Regelmatige sortering en knolvorm
- Heldere donkerrode schil
- Hoog drogestofgehalte
- Goede kookkwaliteit



Landbouwkundige eigenschappen

Rijptijd	55	Laat
Kiemrust	61	Gemiddeld
Opbrengst groen	107	Hoog
Opbrengst rijp	109	Hoog
Grofheid	80	Grof
Knolvorm		Ovaal / Lang-ovaal
Knolaantal		12-14
Schilkleur		Rood
Vleeskleur na koken		Licht geel
Kooktype		B - iets kruimig
Droge stof/Zetmeel %		22% / 16,1%
OWG/Soortelijk gewicht		406 / 1,087
Blauwgevoeligheid	12	Vrij gevoelig
Sencor gevoeligheid	82	● ● ● ● ●
Onderzeeërvorming	79	● ● ● ● ●



Schil- en vleeskleur



Kooktype



Rijptijd

Plantafstanden

Markt: 28-55 mm.

Maat	Knollen/ha	Rijafstand	
		75 cm	90 cm
28/35	45.000	30	25
35/45	42.000	32	26
35/55	40.000	33	28
50/55	37.000	36	30
55/65	35.000	38	32

Resistenties

Phytophthora loof	55	● ● ● ● ●
Phytophthora knol	57	● ● ● ● ●
Alternaria	81	● ● ● ● ●
Schurft	56	● ● ● ● ●
Poederschurft	54	● ● ● ● ●
Kringerigheid	72	● ● ● ● ●
Y-virus	17	● ● ● ● ●
Yntn-virus knoltolerantie	94	● ● ● ● ●

Aardappelmoetheid

Ro1/4 *2	● ● ● ● ●
Ro2/3 *1	● ● ● ● ●
Ro5 *1	● ● ● ● ●
Pa2 *1	● ● ● ● ●
Pa3 *1	● ● ● ● ●

Wratziekte

F1 10	● ● ● ● ●
F2	● ● ● ● ●
F6	● ● ● ● ●
F18	● ● ● ● ●


* HZPC eigen meting / Geen officiële meting

Bemesting

- Pas de bemesting aan op basis van de resultaten van de bodemanalyse.
- Raadpleeg altijd de lokale en huidige regels over gewasbemesting.
- Stikstof (N) : Normale dosering (170-210Kg N/Ha inclusief bodemvoorraad)
- Fosfaat (P) en Kalium (K) : volgens standaard advies.



Teeltadvies Consumptieteelt **TRADITIONAL FRESH**




Voorbehandeling en poten

- Voorkiemen is niet noodzakelijk.
- Vermijd gronden met een hoog risico op poederschurft.
- Wanneer geplant wordt op zware kleigrond, is een goede structuur cruciaal.
- Zorg voor een goede rugopbouw om groene knollen te voorkomen.
- Kan worden geplant in het witte puntjes stadium. Voorkiemen kan de teelt vervroegen.
- Knollen groeien vrij diep en verspreid in de rug.




Teelt

- De opkomst is gelijkmatig, met een goede loofontwikkeling.
- Zorg voor een goede vochtvoorziening om gewone schurft te voorkomen.
- Ondanks de hoge resistentie tegen Phytophthora is een preventieve behandeling gewenst, vanwege het lange groeiseizoen.



Loofdoding en oogst

- Geef voldoende aandacht aan loofvernietiging, vooral bij hoge stikstofgiften.
- Zorgdragen voor een afgerijpt gewas tijdens de loofvernietiging.
- RODEO groeit verspreid in de rug. Let hierop met rooien.
- De schil moet volledig zijn afgehard voordat er kan worden geoogst.
- RODEO is vrij gevoelig voor stootblauw. Beperk de valhoogte en voorkom mechanische beschadiging.



Bewaring

- Snel drogen en droog houden om zilverschurft te voorkomen.
- Een stabiele temperatuur tijdens de bewaring, voorkomt de uitbreiding van zilverschurft.