



Anbauempfehlung Speisekartoffeln TRADITIONAL FRESH

- Großfallend
- Hoher Ertrag
- Niedriger Stickstoffbedarf
- leuchtende tiefröte Schale



Sorteneigenschaften

Reifezeit	58	Mittelspät
Keimruhe	72	Lang
Ertrag	121	Sehr hoch
Sortierung	85	Großfallend
Knollenform		Oval
Knollenzahl		9-11
Schalenfarbe		Dunkelrot
Fleischfarbe kochen		Hellgelb
Kochtyp		AB - Vorw. Festkochend
TS/Stärke %		18,1% / 12,3%
UWG/Spec. Gewicht		327 / 1,069
Blaufleckigkeit	10	Wenig empfindlich
Metribuzin Empf.	60	●●●●●●
Knöllchensucht	87	●●●●●●



Schalen und Fleischfarbe



Kochtyp



Reifezeit

Pflanzabstände

Sortierung	Knollenzahl/ha	Reihenabstand	
		75 cm	90 cm
28/35	53 000	25	21
35/45	50 000	27	22
35/55	46 000	29	24
50/55	44.500	30	25
55/65	41.500	32	27

Resistenz

Krautfäule	48	●●●●●●
Knollenfäule	56	●●●●●●
Alternaria	90	●●●●●●
Schorf	56	●●●●●●
Pulverschorf	53	●●●●●●
Eisenfleckigkeit	96	●●●●●●
Y-Virus	30	●●●●●●
Yntn Knollentoleranz	99	●●●●●●

Nematodenresist.

Ro1/4	9	●●●●●●	F1	3	●●●●●●
Ro2/3	*2	●●●●●●	F2	3	●●●●●●
Ro5	*6	●●●●●●	F6	3	●●●●●●
Pa2		●●●●●●	F18	*1	●●●●●●
Pa3		●●●●●●			


* HZPC-eigene Analyse / Keine offizielle Analyse

Düngung

- Der Nährstoffbedarf basiert auf den Bodenprobenergebnissen.
- Die Stickstoffgabe in einmal vor dem Pflanzen ausbringen.
- Stickstoff (N): Mittlerer Bedarf (170-210kg N/Ha inklusive Bodenversorgung).
- Kaliumchlorid (KCl) mindestens 6 Wochen vor dem Pflanzen ausbringen, da spätere Gaben einen niedrigen Stärkegehalt verursachen können.
- Kalium- und Phosphatdüngung nach Standardempfehlung.
- Auf die organische Düngermenge achten, um eine späte Mineralisierung zu vermeiden.



Anbauempfehlung Speisekartoffeln TRADITIONAL FRESH



Vorbereitung und Pflanzung

- RONALDO hat eine lange Keimruhe.
- Vorkeimen trägt zur Ernteverfrühung bei.
- Das Pflanzgut vor dem Pflanzen aus dem Kühlhaus nehmen und zeitig aufwärmen.
- Ist geeignet für alle Bodenarten.
- Böden mit zu hohem Risiko auf Pulverschorf vermeiden.
- Ein guter Dammaufbau ist erwünscht, um grüne Knollen vorzubeugen.




Anbau

- Die Laubentwicklung ist stark, deshalb wird eine niedrige Stickstoff(N)Menge empfohlen.
- Normaler Auflauf.
- Die Anwendung von Metribuzin wird im Voraufbau empfohlen. Im Nachaufbau sollte eine niedrige Dosierung eingesetzt werden.
- Eine zu hohe Beregnungsgabe am Ende der Vegetation erhöht die Gefahr auf ausgeprägten Lentitellen.
- Die Krautfäulebehandlungen regelmäßig durchführen, um Kraut- und Knollenfäule vorzubeugen.
- Später in der Saison Pflanzenschutzmittel mit hoher Wirksamkeit gegen Knollenfäule einsetzen.
- Eine vorbeugende Behandlung gegen Phytophthora wird empfohlen.



Krautregulierung und Ernte

- Der Bestand sollte vor der Krautregulierung ausreichend abgereift sein. Dies erhöht das UWG.
- Die Knollen sollten vor der Ernte komplett schalenfest sein.
- Beugen Sie mechanischen Beschädigungen vor, um die Lagerfähigkeit zu verbessern.
- Die Knollen sind großfallend. Vorsichtig ernten und lagern, um Beschädigungen und Blaufleckigkeit zu vermeiden.



Lagerung

- RONALDO ist nicht für eine Langzeitlagerung geeignet.
- Einer Austrocknung vorbeugen, indem mit kleiner Differenz zwischen Kühlungs- und Produkttemperatur gekühlt wird.
- Gute Wundheilung ist wichtig.