




Producción de consumo TRADITIONAL FRESH

- Tubérculos grandes
- Elevada producción
- Baja necesidad de nitrógeno
- Piel roja oscura brillante



Propiedades agronómicas

Maduración	58	Semi- tardia
Período de dormencia	72	Largo
Producción	121	Muy alta
Tamaño del tuberculo	85	Calibre grande
Forma		Oval
Número de tubérculos		9-11
Color de piel		Rojo oscuro
Color carne cocinar		Amarilla clara
Tipo de cocion		AB - Ligeramente firme
Materia seca/Almidon %		18,1% / 12,3%
/Peso específico		327 / 1,069
Golpeo interno	10	Algo sensible
Sens. Metribuzin	60	● ● ● ● ●
Fenómeno patatitas	87	● ● ● ● ●



Color de piel y carne



Tipo de cocion



Maduración

Densidad de plantación

Calibre	Densidad de plantación/ha	Distancia entre caballones	
		75 cm	90 cm
28/35	53.000	25	21
35/45	50.000	27	22
35/55	46.000	29	24
50/55	44.500	30	25
55/65	41.500	32	27

Resistencias

Mildíu en planta	48	● ● ● ● ●
Mildíu en el tubérculo	56	● ● ● ● ●
Alternaria	90	● ● ● ● ●
Sarna común	56	● ● ● ● ●
Sarna verrugosa	53	● ● ● ● ●
Spraing	96	● ● ● ● ●
Virus Y	30	● ● ● ● ●
Tol. Yntn tubérculo	99	● ● ● ● ●

Res. a nemátodos		Roña	
Ro1/4 9	● ● ● ● ●	F1 3	● ● ● ● ●
Ro2/3 *2	● ● ● ● ●	F2 3	● ● ● ● ●
Ro5 *6	● ● ● ● ●	F6 3	● ● ● ● ●
Pa2	● ● ● ● ●	F18 *1	● ● ● ● ●
Pa3	● ● ● ● ●		

* Datos internos de HZPC / No probado por un Organismo oficial

Fertilización

- Adaptar el abonado a los análisis del suelo.
- No aplicar ningún abonado en cobertera.
- Nitrógeno (N): aporte medio (170-210Kg N/Ha incluido las reservas del suelo).
- No aplicar cloruro potásico (KCl) menos seis semanas antes de la plantación, ya que las aplicaciones tardías pueden provocar un menor contenido de materia seca.
- Fertilización con potasio y fosfato como recomendación general.
- Prestar atención a la cantidad de abono orgánico para evitar mineralizaciones posteriores.



Producción de consumo TRADITIONAL FRESH



Cultivo

- RONALDO tiene una dormencia larga.
- La prebrotación ayuda a acelerar el crecimiento.
- La semilla debe de sacarse con tiempo de la cámara frigorífica antes de su plantación.
- RONALDO se puede cultivar en todo tipo de suelos.
- Evitar suelos con alto riesgo de sarna pulverulenta.
- Tomar la precaución de hacer buenos caballones para evitar el verdeamiento.




Período de cultivo

- El desarrollo del follaje es fuerte, mantener el nivel de nitrógeno bajo.
- La emergencia es normal.
- El uso de metribuzin se recomienda en preemergencia. En postemergencia utilizar dosis bajas.
- Los riegos demasiado abundantes aumentan la dominancia de las lenticelas.
- Utilizar tratamientos estrictos contra Phytophthora, ya que es muy susceptible en planta y tubérculo.
- Utilizar más tarde en el cultivo productos con una fuerte protección en el tubérculo contra el mildiu en el tubérculo.
- Se aconsejan pulverizaciones preventivas contra Phytophthora.



Destrucción de las plantas

- Asegurar un cultivo lo suficientemente maduro antes de la destrucción de la planta. Esto favorece un mayor contenido de materia seca.
- La piel debe estar totalmente fijada antes de la cosecha.
- Prevenir los daños mecánicos para mejorar el almacenamiento.
- Los tubérculos son de gran calibre. Cosechar y almacenar con cuidado para evitar daños y golpes.



Almacenamiento

- RONALDO no es apropiada para almacenamientos largos.
- Evitar la deshidratación, enfriar con una pequeña diferencia entre el aire de refrigeración y la temperatura del producto.
- Tener cuidado con el período de curación de las heridas.