




TRADITIONAL FRESH

- **Tuberi di grande calibro**
- **Alta resa**
- **Necessita di poco azoto**
- **Buccia lucente rosso scuro**



Caratteristiche agronomiche

Maturazione	58	Medio-tardiva
Durata della dormienza	72	Lunga
Resa	121	Molto alta
Calibro del tubero	85	Grosso
Forma del tubero		Ovale
Numero di tuberi		9-11
Colore della pelle		Rossu scuro
Colore pasta cottura		Giallo chiaro
Tipo di cottura		AB - Quasi Soda
Sostanza secca/Amido		18,1% / 12,3%
Contenuto de sostanza se		327 / 1,069
Inbrunimento interno	10	Qualcosa sensibile
Sens. al Metribuzin	60	● ● ● ● ●
Tuberomania	87	● ● ● ● ●



Colore della pelle e pasta



Tipo di cottura



Maturazione

Densità di semina

Calibro	Densità di semina/ha	Distanza tra le fila	
		75 cm	90 cm
28/35	53.000	25	21
35/45	50.000	27	22
35/55	46.000	29	24
50/55	44.500	30	25
55/65	41.500	32	27

Resistenze

Peronospora fogliame	48	● ● ● ● ●
Peronospora del tubero	56	● ● ● ● ●
Alternaria	90	● ● ● ● ●
Scabbia comune	56	● ● ● ● ●
Scabbia polverulenta	53	● ● ● ● ●
Macchie intern.nematodi	96	● ● ● ● ●
PVY	30	● ● ● ● ●
Yntn tolleranza tubero	99	● ● ● ● ●

Res. a nematodi

Ro1/4	9	● ● ● ● ●
Ro2/3	*2	● ● ● ● ●
Ro5	*6	● ● ● ● ●
Pa2		● ● ● ● ●
Pa3		● ● ● ● ●

Res. a Rogna Nera

F1	3	● ● ● ● ●
F2	3	● ● ● ● ●
F6	3	● ● ● ● ●
F18	*1	● ● ● ● ●

* Dati interni HZPC / Non testati da un Organo ufficiale

Concimazione

- Adottare un piano di concimazione in relazione ai risultati dell'analisi del terreno.
- Non somministrare fertilizzante fogliare.
- Azoto (N): Bisogni medi (170-210 kg N/ha inclusa la dotazione del terreno).
- Non usare cloruro di potassio (KCl) prima di 6 settimane dalla semina. Applicazioni tardive possono determinare basso contenuto di sostanza secca.
- Distribuire quantità di fosforo e potassio seguendo i criteri standard.
- Fare attenzione alla disponibilità di concime organico al fine di evitare una mineralizzazione tardiva.



TRADITIONAL FRESH



Preparazione dei tuberi e semina

- RONALDO ha una lunga dormienza.
- La pre-germinazione contribuisce ad anticipare la crescita.
- I tuberi-seme devono essere tolti in tempo dal frigorifero prima di piantare.
- RONALDO può crescere in tutti i tipi di terreno.
- Evitare terreni con alto rischio di scabbia polverulenta.
- Effettuare una buona rincalzatura per evitare la presenza di tuberi verdi.




Coltivazione

- Lo sviluppo del fogliame è consistente, mantenere basso il livello di azoto.
- L'emergenza è normale.
- L'uso del metribuzin è consigliato in pre-emergenza. In caso di post-emergenza, usare un dosaggio inferiore.
- Un'eccessiva irrigazione aumenta la presenza di lenticelle.
- Attuare un'accurata protezione contro la Phytophthora, per prevenire danni sia al fogliame che sui tuberi.
- Nella fase finale del ciclo vegetativo, usare prodotti in grado di proteggere i tuberi.
- Trattamenti preventivi contro la Phytophthora sono necessari.



Maturazione e raccolta

- Assicurarsi che la coltura abbia raggiunto una sufficiente maturità prima del disseccamento. Ciò favorisce un più alto contenuto di sostanza secca.
- La buccia deve essere completamente formata prima della raccolta.
- Prevenire i danni meccanici per migliorare la conservabilità.
- I tuberi sono grossi. Raccogliere e conservare con delicatezza per evitare danni e urti.



Conservazione

- RONALDO non è idonea per una lunga conservazione.
- Prevenire la disidratazione, facendo in modo che la differenza tra l'aria di raffreddamento e la temperatura del prodotto non sia elevata.
- Controllare il prodotto durante il periodo di cicatrizzazione delle ferite.