




Teeltadvies Consumptieteelt TRADITIONAL FRESH

- Grove knollen
- Hoge opbrengst
- Lage stikstofbehoefte
- Heldere donkerrode schil



Landbouwkundige eigenschappen

Rijptijd	58	Midden laat
Kiemrust	72	Lang
Opbrengst rijp	121	Zeer hoog
Grofheid	85	Grof
Knolvorm		Ovaal
Knolaantal		9-11
Schilkleur		Donker rood
Vleeskleur na koken		Licht geel
Kooktype		AB - Vrij vastkokend
Droge stof/Zetmeel %		18,1% / 12,3%
OWG/Soortelijk gewicht		327 / 1,069
Blauwgevoeligheid	10	Weinig gevoelig
Sencor gevoeligheid	60	● ● ● ● ●
Onderzeeërvorming	87	● ● ● ● ●



Schil- en vleeskleur



Kooktype



Rijptijd

Plantafstanden

Maat	Knollen/ha	Rijfstand	
		75 cm	90 cm
28/35	53.000	25	21
35/45	50.000	27	22
35/55	46.000	29	24
50/55	44.500	30	25
55/65	41.500	32	27

Resistenties

Phytophthora loof	48	● ● ● ● ●
Phytophthora knol	56	● ● ● ● ●
Alternaria	90	● ● ● ● ●
Schurft	56	● ● ● ● ●
Poederschurft	53	● ● ● ● ●
Kringerigheid	96	● ● ● ● ●
Y-virus	30	● ● ● ● ●
Yntn-virus knoltolerantie	99	● ● ● ● ●

Aardappelmoetheid

Ro1/4	9	● ● ● ● ●
Ro2/3	*2	● ● ● ● ●
Ro5	*6	● ● ● ● ●
Pa2		● ● ● ● ●
Pa3		● ● ● ● ●

Wratziekte

F1	3	● ● ● ● ●
F2	3	● ● ● ● ●
F6	3	● ● ● ● ●
F18	*1	● ● ● ● ●

* HZPC eigen meting / Geen officiële meting

Bemesting

- Pas de bemesting aan op basis van de resultaten van de bodemanalyse.
- Raadpleeg altijd de lokale en huidige regels over gewasbemesting.
- De stikstof in één keer toedienen.
- Stikstof (N) : Normale dosering (170-210Kg N/Ha inclusief bodemvoorraad)
- Chloorkali (KCl) niet minder dan 6 weken voor het planten toepassen, late toediening kan een lager drogestofgehalte veroorzaken.
- Fosfaat (P) en Kalium (K) : volgens standaard advies.
- Let op de hoeveelheid organische meststof om late mineralisatie te voorkomen.



Teeltadvies Consumptieteelt TRADITIONAL FRESH



Voorbehandeling en poten

- RONALDO heeft een lange kiemrust.
- Maatregelen om de teelt te vervroegen zijn aan te bevelen.
- Plant niet direct vanuit de koeling, warm het pootgoed tijdig op voor planten.
- RONALDO is geschikt voor alle grondsoorten.
- Vermijd gronden met risico op poederschurft.
- Zorg voor een goede rugopbouw om groene knollen te voorkomen.




Teelt

- Loofontwikkeling is goed, houd de hoeveelheid stikstof laag.
- Normale opkomst.
- Het gebruik van metribuzin wordt voor opkomst geadviseerd. Gebruik na opkomst het lage doseringssysteem.
- Te veel beregenen laat in het seizoen, vergroot de kans op dominante lenticellen.
- Houd een strak spuitschema aan, vanwege gevoeligheid voor Phytophthora in loof en knol.
- Gebruik later in het seizoen middelen met een goede knolbescherming.
- Preventieve behandeling tegen Phytophthora wordt geadviseerd.



Loofdoding en oogst

- Zorg voor een goed afgerijpt gewas, om het drogestofgehalte te vergroten.
- De schil moet volledig zijn afgehard voordat er kan worden geoogst.
- Voorkom mechanische beschadiging, om bewaarbaarheid te verbeteren.
- De aardappels zijn grof. Oogst en bewaar voorzichtig om beschadiging en blauw te voorkomen.



Bewaring

- RONALDO is niet geschikt voor een lange bewaring.
- Voorkom uitdroging; koel met een klein verschil tussen de koellucht en producttemperatuur.
- Wondhelingsperiode in acht nemen.