



Teeltadvies Consumptieteelt Frankrijk

- Goede opbrengst
- Regelmatige sortering en knolvorm
- Goede kookkwaliteit
- Goede resistentie tegen schurft
- Goede bewaarbaarheid



Landbouwkundige eigenschappen

Rijptijd	56	Midden laat
Kiemrust	71	Lang
Opbrengst rijp	109	Hoog
Grofheid	82	Grof
Knolvorm		Ovaal
Knolaantal		9-11
Schilkleur		Rood
Vleeskleur na koken		Wit
Kooktype		B - iets kruimig
Droge stof/Zetmeel %		20,8% / 15%
OWG/Soortelijk gewicht		383 / 1,082
Blauwgevoeligheid	3	Niet gevoelig
Sencor gevoeligheid	50	● ● ● ● ●
Onderzeeërvorming	63	● ● ● ● ●



Schil- en vleeskleur



Kooktype



Rijptijd

Plantafstanden

Markt: 40-70 mm.

Maat	Knollen/ha	Rijafstand	
		75 cm	90 cm
28/35	42.000	32	26
35/45	37.000	36	30
45/50	33.000	41	34
50/55	30.000	44	37

Plantdiepte: standaard, maaivelddiepte.

Controleer altijd het knolaantal voor een juiste berekening.

Resistenties

Phytophthora loof	46	● ● ● ● ●
Phytophthora knol	63	● ● ● ● ●
Alternaria	60	● ● ● ● ●
Schurft	74	● ● ● ● ●
Poederschurft	73	● ● ● ● ●
Kringerigheid	98	● ● ● ● ●
Y-virus	11	● ● ● ● ●
Yntn-virus knoltolerantie	96	● ● ● ● ●

Aardappelmoeheid

Ro1/4	9	● ● ● ● ●
Ro2/3	3	● ● ● ● ●
Ro5	*1	● ● ● ● ●
Pa2	*3	● ● ● ● ●
Pa3		● ● ● ● ●

Wratziekte

F1	10	● ● ● ● ●
F2	*1	● ● ● ● ●
F6	*1	● ● ● ● ●
F18	*1	● ● ● ● ●

* HZPC eigen meting / Geen officiële meting

Bemesting

- Pas de bemesting aan op basis van de resultaten van de bodemanalyse.
- Raadpleeg altijd de lokale en huidige regels over gewasbemesting.
- Stikstof moet altijd in één keer gegeven worden
- Stikstof (N) : Hoge dosering (210-250Kg N/Ha inclusief bodemvoorraad)
- Fosfaat (P) en Kalium (K) : volgens standaard advies.



Teeltadvies Consumptieteelt Frankrijk



Voorbehandeling en poten

- Warm het pootgoed op en plant de knollen met witte puntjes.
- Warme stoot: Minimaal 3 weken.
- Behandel ROSI pootgoed altijd tegen Rhizoctonia.
- Het ras is gevoelig voor onderzeeërvorming. Niet planten in koude grond.
- In warme grond planten, niet te vroeg.




Teelt

- De opkomst is gelijkmatig, met een goede loofontwikkeling.
- ROSI is gevoelig voor metribuzin, ook bij toediening voor de opkomst.
- Berekening wordt geadviseerd om het risico op doorwas te verminderen. Start irrigatie voordat de planten een hoogte van 10cm bereiken en behoud een optimale bodemvochtigheid gedurende het groeiseizoen.
- Houd een strak spuitschema aan, vanwege gevoeligheid voor Phytophthora in loof.
- ROSI is vatbaar voor Alternaria, gebruik een robuust bestreidingsprogramma



Loofdding en oogst

- Alleen een rijp gewas zal een goed bewaarproduct geven.
- Zorgdragen voor een afgerijpt gewas tijdens de loofvernietiging.
- De schil moet volledig zijn afgehard voordat er kan worden geoogst.



Bewaring

- Met het juiste bewaarregime, is ROSI geschikt voor de lange bewaring.
- Snel drogen en droog houden om zilverschurft te voorkomen.
- Bewaartemperatuur: 5 °C.
- Verlaag de temperatuur 0,5-0,7 °C per dag naar een stabiele waarde, van 5°C.
- Ventileer kort maar regelmatig om CO2-ophoping te voorkomen.
- Elke temperatuurschommeling gecombineerd met condens kan resulteren in vroege kieming en een hoog risico op zilverschurft.