



Teeltadvies Consumptieteelt TRADITIONAL FRESH

- Goede opbrengst
- Regelmatige sortering en knolvorm
- Brede aanpassing aan weersomstandigheden
- Hoog drogestofgehalte
- Goede resistentie tegen schurft en poederschurft



Landbouwkundige eigenschappen

Rijptijd	56	Midden laat
Kiemrust	71	Lang
Opbrengst rijp	109	Hoog
Grofheid	82	Grof
Knolvorm		Ovaal
Knolaantal		9-11
Schilkleur		Rood
Vleeskleur na koken		Wit
Kooktype		B - iets kruimig
Droge stof/Zetmeel %		20,8% / 15%
OWG/Soortelijk gewicht		383 / 1,082
Blauwgevoeligheid	3	Niet gevoelig
Sencor gevoeligheid	50	● ● ● ● ●
Onderzeeërvorming	63	● ● ● ● ●



Schil- en vleeskleur



Kooktype



Rijptijd

Plantafstanden

Maat	Knollen/ha	Rijfstand	
		75 cm	90 cm
28/35	50.000	27	22
35/45	46.000	29	24
35/55	43.000	31	26
50/55	40.000	33	28
55/65	38.000	35	29

Plantdiepte: standaard, maaivelddiepte.

Controleer altijd het knolaantal voor een juiste berekening.

Resistenties

Phytophthora loof	46	● ● ● ● ●
Phytophthora knol	63	● ● ● ● ●
Alternaria	60	● ● ● ● ●
Schurft	74	● ● ● ● ●
Poederschurft	73	● ● ● ● ●
Kringerigheid	98	● ● ● ● ●
Y-virus	11	● ● ● ● ●
Yntn-virus knoltolerantie	96	● ● ● ● ●

Aardappelmoeheid

Ro1/4	9	● ● ● ● ●
Ro2/3	3	● ● ● ● ●
Ro5	*1	● ● ● ● ●
Pa2	*3	● ● ● ● ●
Pa3		● ● ● ● ●

Wratziekte

F1	10	● ● ● ● ●
F2	*1	● ● ● ● ●
F6	*1	● ● ● ● ●
F18	*1	● ● ● ● ●

* HZPC eigen meting / Geen officiële meting

Bemesting

- Deelgift wordt aanbevolen, 4/5 voor het planten en 1/5 na het planten.
- Stem het tijdstip van bemesting af, om een natuurlijk gerijpt gewas te verkrijgen.
- Stikstof (N) : Hoge dosering (210-250Kg N/ha inclusief bodemvoorraad)
- Let op de hoeveelheid organische meststof om late mineralisatie te voorkomen.



Teeltadvies Consumptieteelt **TRADITIONAL FRESH**




Voorbehandeling en poten

- ROSI heeft een gemiddelde kiemrust.
- Maatregelen om de teelt te vervroegen zijn aan te bevelen.
- Het ras is gevoelig voor onderzeeërvorming. Niet planten in koude grond.
- ROSI is geschikt voor alle grondsoorten.
- Voor herfst/winterteelt wordt een knolbehandeling tegen Rhizoctonia aanbevolen.




Teelt

- De opkomst is gelijkmatig, met een goede loofontwikkeling.
- ROSI is gevoelig voor metribuzin, ook bij toediening voor de opkomst.
- Beregening wordt geadviseerd om het risico op doorwas te verminderen. Start irrigatie voordat de planten een hoogte van 10cm bereiken en behoud een optimale bodemvochtigheid gedurende het groeiseizoen.
- ROSI is gevoelig voor Alternaria. Start de gewasbescherming rond de bloeiperiode.



Loofdoding en oogst

- Alleen een rijp gewas zal een goed bewaarproduct geven.
- Zorgdragen voor een afgerijpt gewas tijdens de loofvernietiging.
- Hergroei ten allen tijde voorkomen i.v.m. virusgevoeligheid.



Bewaring

- ROSI heeft een goede kiemrust, luchtkoeling kan worden gebruikt voor de eerste maanden na de oogst.
- Snel drogen en droog houden om zilverschurft te voorkomen.
- Bewaartemperatuur: 5 °C.
- Ventileer kort maar regelmatig om CO2-ophoping te voorkomen.