



Conseils pour la production de pomme de terre de consommation TRADITIONAL FRES

- Tubercules de gros calibres
- Potentiel de rendement très élevé
- Peut être utilisée en deuxième culture (automne/hiver)
- Bonne aptitude à la friture
- Bonne tolérance à la gale commune et à la gale poudreuse



Caractéristiques agronomiques

Maturité	58	Demi-tardive
Période de dormance	70	Longue
Rendement à maturité	119	Très élevé
Calibre	86	Très gros
Forme		Oblong / Oblong allongé
Nombre de tubercules		9-11
Couleur de peau		Jaune clair
Chair après cuisson		Crème
Type de cuisson		B - Légèrement farineux
Matière sèche/Amidon %		19,3% / 13,4%
Poids sous l'eau/		351 / 1,075
Noircissement interne	15	Moyennement sensible
Sens. à la Métribuzine	71	● ● ● ● ●
Boulage	90	● ● ● ● ●



Couleur de peau et chair



Type de cuisson



Maturité

Densité du peuplement

Calibre	Densité de plantation/ha	Inter-rangs	
		75 cm	90 cm
28/35	50 000	27	22
35/45	44 000	30	25
35/55	40 000	33	28
50/55	39.000	34	28
55/65	37.000	36	30

Profondeur de plantation: normale.

Toujours vérifier le nombre de tubercules/kg pour une densité de plantation plus précise.

Résistances

Mildiou du feuillage	53	● ● ● ● ●
Mildiou du tubercule	50	● ● ● ● ●
Alternaria	69	● ● ● ● ●
Gale commune	66	● ● ● ● ●
Gale poudreuse	61	● ● ● ● ●
Virus rattle du tabac	59	● ● ● ● ●
Virus Y	23	● ● ● ● ●
Yntn virus sur tubercule	99	● ● ● ● ●

Nématodes

Ro1/4	9	● ● ● ● ●
Ro2/3	*1	● ● ● ● ●
Ro5	*5	● ● ● ● ●
Pa2		● ● ● ● ●
Pa3		● ● ● ● ●

Galle Verruqueuse

F1	9	● ● ● ● ●
F2	*5	● ● ● ● ●
F6	*1	● ● ● ● ●
F18	*1	● ● ● ● ●


* Données internes HZPC / Non testées par un Organisme officiel

Fertilisation

- Adapter la fertilisation selon l'analyse de sol.
- Toujours se référer aux conditions légales en vigueur dans votre Région.
- Le fractionnement de l'azote permet d'éviter un développement excessif du feuillage.
- Appliquer 2/3 avant la plantation et 1/3 en couverture.
- Ne pas apporter d'azote trop tardivement afin d'obtenir une culture arrivant naturellement à sénescence.
- Azote (N): Besoins moyens (170-210 kg N/ha, reliquats inclus).
- Fertilisation phospho-potassique selon analyse de sol.
- Modifier l'apport d'engrais organique pour éviter des minéralisations trop tardives.



Conseils pour la production de pomme de terre de consommation **TRADITIONAL FRES**




Plantation

- SABABA présente une dormance moyenne.
- Des plants physiologiquement âgés ou prégermés induisent une récolte plus précoce.
- Veiller à avoir des germes solides pour éviter le dégermage.
- SABABA peut être cultivée sur tous types de sols.
- Construire une butte importante pour éviter le verdissement des tubercules.
- Peut être plantée au stade point blanc, mais une prégermination bien faite rendra la culture plus hâtive.
- Pour des cultures d'automne/hiver, un traitement anti-rhizoctonia est recommandé.




Culture

- La levée est homogène, avec un bon développement du feuillage.
- L'utilisation de la métribuzine est recommandée en pré-levée. En cas de traitement post-levée, nous recommandons l'application de faibles doses.
- SABABA a une bonne tolérance au stress hydrique.
- Porter une attention particulière à la protection des tubercules contre le mildiou.
- Un programme préventif anti-phytophthora est recommandé.



Défanage et Récolte

- Attendre la sénescence naturelle et que les tubercules soient suffisamment solides.
- Les tubercules sont de gros calibres. Récolter et stocker avec soin pour éviter les coups bleus et les endommagements.
- SABABA est modérément sensible aux coups bleus. Diminuer la hauteur de chute et éviter les endommagements mécaniques.



Conservation

- SABABA est adaptée au stockage, même pour de longues périodes.
- Respecter la période de cicatrisation.