




TRADITIONAL FRESH

- Tuberi di grande calibro
- Alta resa
- Idonea per la produzione bisestile
- Idonea per la frittura a casa
- Buona resistenza a scabbia pulverulenta e scabbia comune



Caratteristiche agronomiche

Maturazione	58	Medio-tardiva
Durata della dormienza	70	Lunga
Resa	119	Molto alta
Calibro del tubero	86	Molto grosso
Forma del tubero		Ovale / Lunga-ovale
Numero di tuberi		9-11
Colore della pelle		Giallo-chiara
Colore pasta cotta		Crema
Tipo di cottura		B - Quasi farinosa
Sostanza secca/Amido		19,3% / 13,4%
Contenuto de sostanza se		351 / 1,075
Inbrunimento interno	15	Moderatamente sensibile
Sens. al Metribuzin	71	● ● ● ● ●
Tuberomania	90	● ● ● ● ●



Colore della pelle e pasta



Tipo di cottura



Maturazione

Densità di semina

Calibro	Densità di semina/ha	Distanza tra le fila	
		75 cm	90 cm
28/35	50.000	27	22
35/45	44.000	30	25
35/55	40.000	33	28
50/55	39.000	34	28
55/65	37.000	36	30

Profondità di semina: normale.

Controllare sempre il numero di tuberi per un calcolo accurato.

Resistenze

Peronospora fogliame	53	● ● ● ● ●
Peronospora del tubero	50	● ● ● ● ●
Alternaria	69	● ● ● ● ●
Scabbia comune	66	● ● ● ● ●
Scabbia pulverulenta	61	● ● ● ● ●
Macchie intern.nematodi	59	● ● ● ● ●
PVY	23	● ● ● ● ●
Yntn tolleranza tubero	99	● ● ● ● ●

Res. a nematodi

Ro1/4	9	● ● ● ● ●
Ro2/3	*1	● ● ● ● ●
Ro5	*5	● ● ● ● ●
Pa2		● ● ● ● ●
Pa3		● ● ● ● ●

Res. a Rogna Nera

F1	9	● ● ● ● ●
F2	*5	● ● ● ● ●
F6	*1	● ● ● ● ●
F18	*1	● ● ● ● ●

* Dati interni HZPC / Non testati da un Organo ufficiale

Concimazione

- Adottare un piano di concimazione in relazione ai risultati dell'analisi del terreno.
-
- Suddividere la somministrazione può prevenire un eccessivo sviluppo iniziale del fogliame.
- Applicare 2/3 prima della semina ed 1/3 alla rincalzatura.
- Prestare attenzione al momento della concimazione per assicurare una naturale maturazione della coltura.
- Azoto (N): Bisogni medi (170-210 kg N/ha inclusa la dotazione del terreno).
- Distribuire quantità di fosforo e potassio seguendo i criteri standard.
- Fare attenzione alla disponibilità di concime organico al fine di evitare una mineralizzazione tardiva.



TRADITIONAL FRESH



Preparazione dei tuberi e semina

- SABABA ha media dormienza.
- L'età fisiologica avanzata del seme / pre-germogliazione determina una coltura precoce.
- I germogli devono essere ben robusti per evitare la loro rottura.
- SABABA può crescere in tutti i tipi di terreno.
- Effettuare una buona rincalzatura per evitare la presenza di tuberi verdi.
- Può essere piantata quando le gemme sono aperte, ma una buona pre-germogliazione avvantaggia la coltura.
- Quando usata per semina invernale, un trattamento contro la Rhizoctonia è necessario.




Coltivazione

- L'emergenza è uniforme con un buon sviluppo fogliare.
- L'uso del metribuzin è consigliato in pre-emergenza. In caso di post-emergenza, usare un dosaggio inferiore.
- SABABA ha una buona tolleranza alla siccità.
- Prestare particolare attenzione ai tuberi a causa della maggiore sensibilità alla peronospora sui tuberi.
- Trattamenti preventivi contro la Phytophthora sono necessari.



Maturazione e raccolta

- Assicurarsi che la coltura sia allo stadio di maturazione naturale e con tuberi sufficientemente induriti.
- I tuberi sono di grandi dimensioni. Raccogliere e conservare con cura per evitare danni e urti.
- SABABA è moderatamente suscettibile agli urti. Ridurre l'altezza di caduta ed evitare danni meccanici.



Conservazione

- SABABA è ben conservabile, anche per un lungo periodo.
- Controllare il prodotto durante il periodo di cicatrizzazione delle ferite.