




## Teeltadvies Consumptieteelt TRADITIONAL FRESH

- Grove knollen
- Hoge opbrengst
- Geschikt voor winterteelt
- Geschikt voor (thuis)frites
- Goede resistentie tegen schurft en poederschurft



### Landbouwkundige eigenschappen

|                        |     |                    |
|------------------------|-----|--------------------|
| Rijptijd               | 58  | Midden laat        |
| Kiemrust               | 70  | Lang               |
| Opbrengst rijp         | 119 | Zeer hoog          |
| Grofheid               | 86  | Zeer grof          |
| Knolvorm               |     | Ovaal / Lang-ovaal |
| Knolaantal             |     | 9-11               |
| Schilkleur             |     | Licht geel         |
| Vleeskleur na koken    |     | Creme              |
| Kooktype               |     | B - iets kruimig   |
| Droge stof/Zetmeel %   |     | 19,3% / 13,4%      |
| OWG/Soortelijk gewicht |     | 351 / 1,075        |
| Blauwgevoeligheid      | 15  | Vrij gevoelig      |
| Sencor gevoeligheid    | 71  | ● ● ● ● ●          |
| Onderzeeërvorming      | 90  | ● ● ● ● ●          |



Schil- en vleeskleur



Kooktype



Rijptijd

### Plantafstanden

| Maat  | Knollen/ha | Rijfstand |       |
|-------|------------|-----------|-------|
|       |            | 75 cm     | 90 cm |
| 28/35 | 50.000     | 27        | 22    |
| 35/45 | 44.000     | 30        | 25    |
| 35/55 | 40.000     | 33        | 28    |
| 50/55 | 39.000     | 34        | 28    |
| 55/65 | 37.000     | 36        | 30    |

Plantdiepte: standaard, maaivelddiepte.

Controleer altijd het knolaantal voor een juiste berekening.

### Resistenties

|                           |    |           |
|---------------------------|----|-----------|
| Phytophthora loof         | 53 | ● ● ● ● ● |
| Phytophthora knol         | 50 | ● ● ● ● ● |
| Alternaria                | 69 | ● ● ● ● ● |
| Schurft                   | 66 | ● ● ● ● ● |
| Poederschurft             | 61 | ● ● ● ● ● |
| Kringerigheid             | 59 | ● ● ● ● ● |
| Y-virus                   | 23 | ● ● ● ● ● |
| Yntn-virus knoltolerantie | 99 | ● ● ● ● ● |

| Aardappelmoetheid |    | Wratziekte |    |
|-------------------|----|------------|----|
| Ro1/4             | 9  | F1         | 9  |
| Ro2/3             | *1 | F2         | *5 |
| Ro5               | *5 | F6         | *1 |
| Pa2               |    | F18        | *1 |
| Pa3               |    |            |    |

\* HZPC eigen meting / Geen officiële meting

### Bemesting

- Pas de bemesting aan op basis van de resultaten van de bodemanalyse.
- Raadpleeg altijd de lokale en huidige regels over gewasbemesting.
- Een gedeelte gift voorkomt explosieve loofgroei.
- Deelgift wordt aanbevolen, 2/3 voor het planten en 1/3 na knolzetting.
- Stem het tijdstip van bemesting af, om een natuurlijk gerijpt gewas te verkrijgen.
- Stikstof (N) : Normale dosering (170-210Kg N/Ha inclusief bodemvoorraad)
- Fosfaat (P) en Kalium (K) : volgens standaard advies.
- Let op de hoeveelheid organische meststof om late mineralisatie te voorkomen.



## Teeltadvies Consumptieteelt TRADITIONAL FRESH



### Voorbehandeling en poten

- SABABA heeft een gemiddelde kiemrust.
- Fysiologisch verouderd pootgoed en voorkiemen resulteren in een vroegere oogst.
- Zorg voor een goed afgeharde korte kiem, om kiembreuk te voorkomen.
- SABABA is geschikt voor alle grondsoorten.
- Zorg voor een goede rugopbouw om groene knollen te voorkomen.
- Kan worden geplant in het witte puntjes stadium. Voorkiemen kan de teelt vervroegen.
- Voor herfst/winterteelt wordt een knolbehandeling tegen Rhizoctonia aanbevolen.




### Teelt

- De opkomst is gelijkmatig, met een goede loofontwikkeling.
- Het gebruik van metribuzin wordt voor opkomst geadviseerd. Gebruik na opkomst het lage doseringssysteem.
- SABABA heeft een goede droogtetolerantie.
- Besteed extra aandacht aan knolbescherming i.v.m. hogere gevoeligheid voor Phytophthora in de knol.
- Preventieve behandeling tegen Phytophthora wordt geadviseerd.



### Loofdding en oogst

- Zorg voor een afgerijpt gewas en voldoende afgeharde knollen tijdens oogst.
- De knollen zijn grof. Voorzichtig rooien en bewaren om beschadiging te voorkomen.
- SABABA is vrij gevoelig voor stootblauw. Beperk de valhoogte en voorkom mechanische beschadiging.



### Bewaring

- Geschikt voor lange bewaring.
- Wondhelingsperiode in acht nemen.