



## Producción de consumo United Kingdom FRENCH FRIES

- **Maduración y tuberización temprana**
- **Piel brillante muy atractiva**
- **Elevada producción**
- **Variedad multifuncional**
- **Calidad de fritura alta y constante**



### Propiedades agronómicas

Maduración	65	Semi-temprana
Período de dormencia	56	Medio
Producción	110	Alta
Tamaño del tubérculo	84	Calibre grande
Forma		Oval
Número de tubérculos		9-11
Color de piel		Amarilla
Color carne cocinar		Amarilla clara
Tipo de cocción		B - Ligeramente harinosos
Materia seca/Almidón %		21,1% / 15,2%
/Peso específico		389 / 1,083
Golpeo interno	6	Algo sensible
Sens. Metribuzin	58	● ● ● ● ●
Fenómeno patatitas	44	● ● ● ● ●



Color de piel y carne



Tipo de cocción



Maduración

### Densidad de plantación

Calibre comercial: 40-90 mm.

Distancia entre caballones

Calibre    Densidad de plantación/ha    75 cm    90 cm

### Resistencias

Mildíu en planta	43	● ● ● ● ●
Mildíu en el tubérculo	65	● ● ● ● ●
Alternaria	66	● ● ● ● ●
Sarna común	57	● ● ● ● ●
Sarna verrugosa	63	● ● ● ● ●
Spraing	98	● ● ● ● ●
Virus Y	98	● ● ● ● ●
Tol. Yntn tubérculo	99	● ● ● ● ●
Res. a nemátodos		
Ro1/4 9		● ● ● ● ●
Ro2/3 2		● ● ● ● ●
Ro5 *2		● ● ● ● ●
Pa2		● ● ● ● ●
Pa3 *2		● ● ● ● ●
Roña		
F1 10		● ● ● ● ●
F2 *3		● ● ● ● ●
F6 *9		● ● ● ● ●
F18		● ● ● ● ●

### Fertilización

- Adaptar el abonado a los análisis del suelo.
- 
- 
- Aplicar 2/3 antes de la plantación y 1/3 en cobertera.
- Nitrógeno (N): aporte medio (170-210Kg N/Ha incluido las reservas del suelo).
- Fertilización con potasio y fosfato como recomendación general.
- Prestar atención a la cantidad de abono orgánico para evitar mineralizaciones posteriores.

\* Datos internos de HZPC / No probado por un Organismo oficial



## Producción de consumo United Kingdom FRENCH FRIES



### Cultivo

- SAGITTA tiene una dormencia corta.
- Mantener la semilla en cámara frigorífica para prevenir su envejecimiento y deshidratación.
- Antes de la plantación, permitir que la semilla se aclimate a las condiciones locales.
- "No desbrotar para evitar el problema de ""patatitas""."
- Tratar siempre la semilla de SAGITTA y el suelo contra rizoctonia.
- Los mejores resultados se obtienen en terrenos ligeros.
- Plantar en terrenos cálidos, no plantar demasiado pronto.
- Al plantar con yemas blanquecinas se obtienen los mejores resultados.
- Tomar la precaución de hacer buenos caballones para evitar el verdeamiento.
- SAGITTA puede plantarse temprano, pero evitar plantar en condiciones frías.




### Período de cultivo

- La emergencia es uniforme, con un buen desarrollo de la planta.
- SAGITTA es muy sensible a metribuzin, usarlo solo en preemergencia.
- SAGITTA es sensible a Alternaria. Comenzar los tratamientos en el momento de la floración.
- Utilizar un programa estricto para la protección contra Phytophthora, debido a la susceptibilidad en la planta.
- SAGITTA es bastante resistente al virus TVR.



### Destrucción de las plantas

- Asegurar un cultivo lo suficientemente maduro antes de la destrucción de la planta. Esto favorece un mayor contenido de materia seca.
- Los tubérculos son de gran calibre. Cosechar y almacenar con cuidado para evitar daños y golpes.



### Almacenamiento

- SAGITTA no es apropiada para almacenamientos largos.
- Tener cuidado con el período de curación de las heridas.
- Almacenar a una temperatura estable de 7 °C.
- Ventilar de forma regular pero breve para prevenir la acumulación de CO2.