



Producción de consumo United Kingdom RETAIL FRESH

- **Maduración y tuberización temprana**
- **Piel brillante muy atractiva**
- **Elevada producción**
- **Variedad multifuncional**
- **Calidad de fritura alta y constante**



Propiedades agronómicas

Maduración	65	Semi-temprana
Período de dormencia	56	Medio
Producción	110	Alta
Tamaño del tubérculo	84	Calibre grande
Forma		Oval
Número de tubérculos		9-11
Color de piel		Amarilla
Color carne cocinar		Amarilla clara
Tipo de cocción		B - Ligeramente harinos
Materia seca/Almidon %		21,1% / 15,2%
/Peso específico		389 / 1,083
Golpeo interno	6	Algo sensible
Sens. Metribuzin	58	● ● ● ● ●
Fenómeno patatitas	44	● ● ● ● ●



Color de piel y carne



Tipo de cocción



Maduración

Densidad de plantación

Calibre comercial: 40-90 mm.

Distancia entre caballones

Calibre Densidad de plantación/ha 75 cm 90 cm

Resistencias

Mildió en planta	43	● ● ● ● ●
Mildió en el tubérculo	65	● ● ● ● ●
Alternaria	66	● ● ● ● ●
Sarna común	57	● ● ● ● ●
Sarna verrugosa	63	● ● ● ● ●
Spraing	98	● ● ● ● ●
Virus Y	98	● ● ● ● ●
Tol. Yntn tubérculo	99	● ● ● ● ●
Res. a nemátodos		
Ro1/4 9	● ● ● ● ●	
Ro2/3 2	● ● ● ● ●	
Ro5 *2	● ● ● ● ●	
Pa2	● ● ● ● ●	
Pa3 *2	● ● ● ● ●	
Roña		
F1 10	● ● ● ● ●	
F2 *3	● ● ● ● ●	
F6 *9	● ● ● ● ●	
F18	● ● ● ● ●	

Fertilización

- Adaptar el abonado a los análisis del suelo.
-
-
- Aplicar 2/3 antes de la plantación y 1/3 en cobertera.
- Nitrógeno (N): aporte medio (170-210Kg N/Ha incluido las reservas del suelo).
- Fertilización con potasio y fosfato como recomendación general.
- Prestar atención a la cantidad de abono orgánico para evitar mineralizaciones posteriores.

* Datos internos de HZPC / No probado por un Organismo oficial



Producción de consumo United Kingdom RETAIL FRESH




Cultivo

- SAGITTA tiene una dormencia corta.
- Mantener la semilla en cámara frigorífica para prevenir su envejecimiento y deshidratación.
- Antes de la plantación, permitir que la semilla se aclimate a las condiciones locales.
- "No desbrotar para evitar el problema de ""patatitas""."
- Tratar siempre la semilla de SAGITTA y el suelo contra rizoctonia.
- Los mejores resultados se obtienen en terrenos ligeros.
- Plantar en terrenos cálidos, no plantar demasiado pronto.
- Plantar SAGITTA 3 cm más profundo para evitar el verdeamiento.
- Al plantar con yemas blanquecinas se obtienen los mejores resultados.
- Tomar la precaución de hacer buenos caballones para evitar el verdeamiento.
- SAGITTA puede plantarse temprano, pero evitar plantar en condiciones frías.




Período de cultivo

- La emergencia es uniforme, con un buen desarrollo de la planta.
- SAGITTA es muy sensible a metribuzin, usarlo solo en preemergencia.
- SAGITTA es sensible a Alternaria. Comenzar los tratamientos en el momento de la floración.
- Utilizar un programa estricto para la protección contra Phytophthora, debido a la susceptibilidad en la planta.
- SAGITTA es bastante resistente al virus TVR.



Destrucción de las plantas

- Asegurar una maduración natural del cultivo y un endurecimiento suficiente de los tubérculos.
- Los tubérculos son de gran calibre. Cosechar y almacenar con cuidado para evitar daños y golpes.



Almacenamiento

- Tener cuidado con el período de curación de las heridas.
- Temperatura de almacenamiento: 3 °C.
- Unas temperaturas estables durante el almacenamiento evitan el desarrollo de sarna plateada.
- Para períodos de almacenamiento superiores a tres meses, se requiere refrigeración.
- Ventilar de forma regular pero breve para prevenir la acumulación de CO2.