



Conseils pour la production de pomme de terre de consommation United Kingdom RET/

- Tubérisation et maturité précoces
- Peau très brillante et attractive
- Potentiel de rendement très élevé
- Variété polyvalente
- Très bonne aptitude à la friture



Caractéristiques agronomiques

Maturité	65	Demi-hâtive
Période de dormance	56	Moyenne
Rendement à maturité	110	Élevé
Calibre	84	Gros
Forme		Oblong
Nombre de tubercules		9-11
Couleur de peau		Jaune
Chair après cuisson		Jaune clair
Type de cuisson		B - Légèrement farineux
Matière sèche/Amidon %		21,1% / 15,2%
Poids sous l'eau/		389 / 1,083
Noircissement interne	6	Peu sensible
Sens. à la Métribuzine	58	
Boulage	44	



Couleur de peau et chair



Type de cuisson



Maturité

Densité du peuplement

Objectif commercial: 40-90 mm.

		Inter-rangs
Calibre	Densité de plantation/ha	75 cm 90 cm

Résistances

Mildiou du feuillage	43	● ● ● ● ●
Mildiou du tubercule	65	● ● ● ● ●
Alternaria	66	● ● ● ● ●
Gale commune	57	● ● ● ● ●
Gale poudreuse	63	● ● ● ● ●
Virus rattle du tabac	98	● ● ● ● ●
Virus Y	98	● ● ● ● ●
Yntn virus sur tubercule	99	● ● ● ● ●

Nématodes

Ro1/4	9	● ● ● ● ●
Ro2/3	2	● ● ● ● ●
Ro5	*2	● ● ● ● ●
Pa2		● ● ● ● ●
Pa3	*2	● ● ● ● ●

Galle Verruqueuse

F1	10	● ● ● ● ●
F2	*3	● ● ● ● ●
F6	*9	● ● ● ● ●
F18		● ● ● ● ●


* Données internes HZPC / Non testées par un Organisme officiel

Fertilisation

- Adapter la fertilisation selon l'analyse de sol.
- Toujours se référer aux conditions légales en vigueur dans votre Région.
- Appliquer 2/3 avant la plantation et 1/3 en couverture.
- Azote (N): Besoins moyens (170-210 kg N/ha, reliquats inclus).
- Fertilisation phospho-potassique selon analyse de sol.
- Modifier l'apport d'engrais organique pour éviter des minéralisations trop tardives.



Conseils pour la production de pomme de terre de consommation United Kingdom RET/



Plantation

- SAGITTA présente une dormance courte.
- Garder les plants en chambre froide pour prévenir le vieillissement physiologique et la déshydratation.
- Habituer les plants à la température ambiante avant plantation.
- Ne pas dégermer pour éviter tous risques de boulage.
- Toujours traiter les plants de SAGITTA et le sol contre le rhizoctone.
- Les meilleurs résultats sont obtenus sur des sols plus légers.
- Planter dans des sols chauds, ne pas planter trop tôt.
- Nous recommandons de planter SAGITTA 3 cm plus profond que la normale pour éviter le verdissement.
- Planter des plants au stade point blanc donne les meilleurs résultats.
- Construire une butte importante pour éviter le verdissement des tubercules.
- SAGITTA peut être plantée précocement, mais éviter de planter dans des conditions trop froides.




Culture

- La levée est homogène, avec un bon développement du feuillage.
- SAGITTA est assez sensible à la métribuzine, traiter uniquement en pré-levée.
- SAGITTA est sensible à l'Alternaria. Commencer les traitements anti-alternaria au cours de la floraison.
- Utiliser un programme efficace pour prévenir le mildiou du feuillage.
- SAGITTA est assez résistante à la nécrose annulaire.



Défanage et Récolte

- Attendre la sénescence naturelle et que les tubercules soient suffisamment solides.
- Les tubercules sont de gros calibres. Récolter et stocker avec soin pour éviter les coups bleus et les endommagements.



Conservation

- Respecter la période de cicatrisation.
- Température de stockage : 3 °C.
- Une température de stockage régulière limitera l'apparition de gale argentée.
- Pour une période de conservation supérieure à 3 mois, un stockage réfrigéré est requis.
- Ventiler régulièrement, mais brièvement, afin de prévenir l'accumulation de CO2.