



Teeltadvies Consumptieteelt TRADITIONAL FRESH WINTERCROP

- Vroege rijptijd met een vroege knolzetting
- Grove knollen
- Hoge opbrengst
- Zeer goede smaak
- Veelzijdig ras



Landbouwkundige eigenschappen

Rijptijd	65	Midden vroeg
Kiemrust	56	Gemiddeld
Opbrengst rijp	110	Hoog
Grofheid	84	Grof
Knolvorm		Ovaal
Knolaantal		9-11
Schilkleur		Geel
Vleeskleur na koken		Licht geel
Kooktype		B - iets kruimig
Droge stof/Zetmeel %		21,1% / 15,2%
OWG/Soortelijk gewicht		389 / 1,083
Blauwgevoeligheid	6	Weinig gevoelig
Sencor gevoeligheid	58	● ● ● ● ●
Onderzeeërvorming	44	● ● ● ● ●



Schil- en vleeskleur



Kooktype



Rijptijd

Plantafstanden

Maat	Knollen/ha	Rijafstand	
		75 cm	90 cm
28/35	53.000	25	21
35/45	46.000	29	24
35/55	42.000	32	26
50/55	36.000	37	31
55/65	34.000	39	33

Plantdiepte: 3 cm onder het maaiveld.

Resistenties

Phytophthora loof	43	● ● ● ● ●
Phytophthora knol	65	● ● ● ● ●
Alternaria	66	● ● ● ● ●
Schurft	57	● ● ● ● ●
Poederschurft	63	● ● ● ● ●
Kringerigheid	98	● ● ● ● ●
Y-virus	98	● ● ● ● ●
Yntn-virus knoltolerantie	99	● ● ● ● ●

Aardappelmoeheid	
Ro1/4	9 ● ● ● ● ●
Ro2/3	2 ● ● ● ● ●
Ro5	*2 ● ● ● ● ●
Pa2	● ● ● ● ●
Pa3	*2 ● ● ● ● ●

Wratziekte	
F1	10 ● ● ● ● ●
F2	*3 ● ● ● ● ●
F6	*9 ● ● ● ● ●
F18	● ● ● ● ●

* HZPC eigen meting / Geen officiële meting

Bemesting

- Pas de bemesting aan op basis van de resultaten van de bodemanalyse.
- Raadpleeg altijd de lokale en huidige regels over gewasbemesting.
- Deelgift wordt aanbevolen, 2/3 voor het planten en 1/3 na knolzetting.
- Stikstof (N) : Hoge dosering (210-250Kg N/ha inclusief bodemvoorraad)
- Fosfaat (P) en Kalium (K) : volgens standaard advies.



Teeltadvies Consumptieteelt TRADITIONAL FRESH WINTERCROP




Voorbehandeling en poten

- Laat het pootgoed voor het poten acclimatiseren.
- Niet afkiemen om onderzeeërvorming te voorkomen.
- Plant niet direct vanuit de koeling, warm het pootgoed tijdig op voor planten.
- Behandel SAGITTA pootgoed en de grond tegen Rhizoctonia.
- De beste kwaliteit wordt gerealiseerd op vruchtbare en lichte grondsoorten.
- In warme grond planten, niet te vroeg.
- Wanneer geplant wordt op zware kleigrond, is een goede structuur cruciaal.
- Planten in het witte-puntjes-stadium geeft de beste resultaten.
- Zorg voor een goede rugopbouw om groene knollen te voorkomen.
- SAGITTA kan vroeg geplant worden, maar vermijd poten onder koude omstandigheden.




Teelt

- De opkomst is gelijkmatig, met een goede loofontwikkeling.
- SAGITTA is gevoelig voor metribuzin, kan alleen voor opkomst gespoten worden.
- De weersomstandigheden hebben een grote invloed op de effectiviteit van metribuzin, pas de dosering aan de weersomstandigheden aan.
- SAGITTA is gevoelig voor Alternaria. Start de gewasbescherming rond de bloeiperiode.
- Gebruik producten die effect hebben op Alternaria solani en alternata.
- Houd een strak spuitschema aan, vanwege gevoeligheid voor Phytophthora in loof.
- Preventieve behandeling tegen Phytophthora wordt geadviseerd.



Loofdoding en oogst

- Zorg voor een goed afgerijpt gewas, om het drogestofgehalte te vergroten.
- De schil moet volledig zijn afgehard voordat er kan worden geoogst.



Bewaring

- Voorkom uitdroging; koel met een klein verschil tussen de koellucht en producttemperatuur.
- Verlaag de temperatuur 0,5-0,7 °C per dag naar een stabiele waarde, niet lager dan 5°C.
- Een lagere bewaartemperatuur dan aanbevolen, resulteert in hogere suikers.
- Ventileer kort maar regelmatig om CO2-ophoping te voorkomen.
- Elke temperatuurschommeling gecombineerd met condens kan resulteren in vroege kieming en een hoog risico op zilverscurft.
- Gebruik de hoogste dosis kiemremmer bij de eerste behandeling.
- Voor lange bewaring moet gebruik worden gemaakt van kiemremmingsmiddelen.