



Teeltadvies Consumptieteelt Groot-Brittannië RETAIL FRESH

- Vroege rijptijd met een vroege knolzetting
- Zeer mooie heldere schil
- Hoge opbrengst
- Veelzijdig ras
- Consistente goede bakkwaliteit



Landbouwkundige eigenschappen

Rijptijd	65	Midden vroeg
Kiemrust	56	Gemiddeld
Opbrengst rijp	110	Hoog
Grofheid	84	Grof
Knolvorm		Ovaal
Knolaantal		9-11
Schilkleur		Geel
Vleeskleur na koken		Licht geel
Kooktype		B - iets kruimig
Droge stof/Zetmeel %		21,1% / 15,2%
OWG/Soortelijk gewicht		389 / 1,083
Blauwgevoeligheid	6	Weinig gevoelig
Sencor gevoeligheid	58	
Onderzeeërvorming	44	



Schil- en vleeskleur



Kooktype



Rijptijd

Plantafstanden

Markt: 40-90 mm.

Maat	Knollen/ha	Rijafstand
		75 cm 90 cm

Resistenties

Phytophthora loof	43	● ● ● ● ●
Phytophthora knol	65	● ● ● ● ●
Alternaria	66	● ● ● ● ●
Schurft	57	● ● ● ● ●
Poederschurft	63	● ● ● ● ●
Kringerigheid	98	● ● ● ● ●
Y-virus	98	● ● ● ● ●
Yntn-virus knoltolerantie	99	● ● ● ● ●

Aardappelmoetheid	
Ro1/4 9	● ● ● ● ●
Ro2/3 2	● ● ● ● ●
Ro5 *2	● ● ● ● ●
Pa2	● ● ● ● ●
Pa3 *2	● ● ● ● ●

Wratziekte	
F1 10	● ● ● ● ●
F2 *3	● ● ● ● ●
F6 *9	● ● ● ● ●
F18	● ● ● ● ●

* HZPC eigen meting / Geen officiële meting

Bemesting

- Pas de bemesting aan op basis van de resultaten van de bodemanalyse.
- Nutrient Management Gids (RB209), Groep 2
- Raadpleeg altijd de lokale en huidige regels over gewasbemesting.
- Deelgift wordt aanbevolen, 2/3 voor het planten en 1/3 na knolzetting.
- Stikstof (N) : Normale dosering (170-210Kg N/ha inclusief bodemvoorraad)
- Fosfaat (P) en Kalium (K) : volgens standaard advies.
- Let op de hoeveelheid organische meststof om late mineralisatie te voorkomen.



Teeltadvies Consumptieteelt Groot-Brittannië RETAIL FRESH



Voorbehandeling en poten

- SAGITTA heeft een korte kiemrust.
- Bewaar pootgoed in de mechanische koeling, om fysiologische ouderdom te voorkomen.
- Laat het pootgoed voor het poten acclimatiseren.
- Niet afkiemen om onderzeeërvorming te voorkomen.
- Behandel SAGITTA pootgoed en de grond tegen Rhizoctonia.
- Lichtere grondsoorten zullen de beste resultaten geven.
- In warme grond planten, niet te vroeg.
- Plant SAGITTA 3 cm onder maaiveld om groene knollen te voorkomen.
- Planten in het witte-puntjes-stadium geeft de beste resultaten.
- Zorg voor een goede rugopbouw om groene knollen te voorkomen.
- SAGITTA kan vroeg geplant worden, maar vermijd poten onder koude omstandigheden.




Teelt

- De opkomst is gelijkmatig, met een goede loofontwikkeling.
- SAGITTA is gevoelig voor metribuzin, kan alleen voor opkomst gespoten worden.
- SAGITTA is gevoelig voor Alternaria. Start de gewasbescherming rond de bloeiperiode.
- Houd een strak spuit-schema aan, vanwege gevoeligheid voor Phytophthora in loof.
- SAGITTA heeft een hoge resistentie tegen TRV.



Loofdding en oogst

- Zorg voor een afgerijpt gewas en voldoende afgeharde knollen tijdens oogst.
- De aardappels zijn grof. Oogst en bewaar voorzichtig om beschadiging en blauw te voorkomen.



Bewaring

- Wondhelingsperiode in acht nemen.
- Bewaartemperatuur: 3 °C.
- Een stabiele temperatuur tijdens de bewaring, voorkomt de uitbreiding van zilverschuift.
- Voor bewaring langer dan 3 maanden is mechanische koeling vereist.
- Ventileer kort maar regelmatig om CO2-ophoping te voorkomen.