SAGITTA

GALLIA X RZ- 86-2918

Produção de batata de consumo FRENCH FRIES

- **Maturação e tuberização precoces**
- **Alto rendimento**
- **Variedade polivalente**

Propriedades agronómicas

Maturação	65	Semi precoce
Periodo de dormencia	56	Medio
Produto final maturação	110	Alto
Tamanho tubérculos	84	Grande calibre
Forma dos tubérculos		Oval
Numero de tubérculos		9-11
Cor da pele		Amarela
Polpa após cozinhar		Amarela clara
Tipo culinário		B - Moderadamente farinh
Peso de matéria seca/Aln		21,1% / 15,2%
Teor de matéria seca/Pes		389 / 1,083
Enegrecimento interno	6	Pouco sensível
Sens. ao Metribuzin	58	
Formacao de Batatinhas	44	

Cor da pele e carne

Tipo culinário

Maturação

Densidade de Plantação

Calibre	Densidade de plantação/ha	Distancia entre linhas 75 cm	90 cm
28/35	50.000	27	22
35/50	38.000	35	29
35/55	36.000	37	31
50/60	32.000	42	35
50/60 semente cortada	40.000	33	28

Profundidade de plantação: 3 cm mais fundo do que o normal.

Resistências

Mildio da folha	43	
Mildio do tuberculo	65	
Alternaria	66	
Sarna comum	57	
Sarna pulvurolenta	63	
Spraing	98	
PVY	98	
Yntn tolerancia tubérculos	99	

Res. aos nematodos		Res. verruga	
Ro1/4	9	F1	10
Ro2/3	2	F2	*3
Ro5	*2	F6	*9
Pa2		F18	
Pa3	*2		

* HZPC own analysis/no official analysis

Fertelização

- Adaptar a fertilização em função das análises do solo.
-
- Aplicar 2/3 antes da plantação e 1/3 na cobertura.
- Azoto (N): Aplicação elevada (210-250Kg N/Ha incluindo a disponibilidade no solo).
- Adubação com Potássio e Fosfatos de acordo com a recomendação padrão.
- Ter em atenção a quantidade de fertilizante orgânico utilizado para evitar mineralizações tardias.

HZPC não assume responsabilidade por quaisquer consequências prejudiciais que possam eventualmente occorrer quando utilizar esta informação 24 Jan 2025
www.hzpc.com

SAGITTA

GALLIA X RZ- 86-2918

Produção de batata de consumo FRENCH FRIES



Preparação e Plantação

- SAGITTA tem uma dormência curta.
- Manter a semente em câmara frigorífica para prevenir o envelhecimento fisiológico e a desidratação.
- Permitir que a semente se adapte às condições locais antes da plantação.
- "Não desgrelar para evitar a ""formação de batatinhas""."
- Tratar sempre sementes de SAGITTA e o solo contra Rhizoctonia.
- Os melhores resultados são obtidos em solos leves.
- Plantação em solos quentes, não plantar muito cedo.
- Plantar com pequenos brolhos brancos proporciona melhores resultados.
- Uma boa amontoa evita o aparecimento de tubérculos verdes.
- SAGITTA pode ser plantada mais cedo, mas evitando condições frias.



Cultivo

- Emergência uniforme, com um bom desenvolvimento da folhagem.
- SAGITTA é muito sensível à Metribuzina, aplicar apenas em pré-emergência.
- SAGITTA é suscetível à Alternaria. Começar tratamento no período da floração.
- Utilizar um plano de tratamentos, devido ao elevado risco do Míldio da folha.
- SAGITTA é bastante resistente ao vírus TRV- PMTV.

Defenagem e Colheita

- Garantir a maturação suficiente da cultura antes da dessecagem, o que permitirá obter um teor de matéria seca mais elevado.
- Os tubérculos são de calibre grande. O arranque e a armazenagem devem ser efetuados com cuidado para evitar danos e golpes.



Armazenamento

- SAGITTA não é adequada para um armazenamento a longo prazo.
- Ter em atenção o período de cicatrização.
- Armazenar a uma temperatura estável de 7 ºC.
- Ventilar com regularidade para evitar acumulação de CO2.
- Utilizar uma dose mais elevada de anti-abrolhante na primeira aplicação.

HZPC não assume responsabilidade por quaisquer consequências prejudiciais que possam eventualmente occorrer quando utilizar esta informação 24 Jan 2025