




Teeltadvies Consumptieteelt TRADITIONAL FRESH

- Zeer mooie heldere schil
- Hoge opbrengst
- Brede aanpassing aan weersomstandigheden
- Lage stikstofbehoefte
- Vroege knolzetting



Landbouwkundige eigenschappen

Rijptijd	54	Laat
Kiemrust	61	Gemiddeld
Opbrengst groen	120	Zeer hoog
Opbrengst rijp	116	Zeer hoog
Grofheid	82	Grof
Knolvorm		Rondovaal
Knolaantal		12-14
Schilkleur		Licht geel
Vleeskleur na koken		Crème
Kooktype		AB - Vrij vastkokend
Droge stof/Zetmeel %		19,7% / 13,8%
OWG/Soortelijk gewicht		359 / 1,077
Blauwgevoeligheid	12	Vrij gevoelig
Sencor gevoeligheid	85	● ● ● ● ●
Onderzeeërvorming	83	● ● ● ● ●



Schil- en vleeskleur



Kooktype



Rijptijd

Plantafstanden

Maat	Knollen/ha	Rijfstand	
		75 cm	90 cm
28/35	45.000	30	25
35/45	40.000	33	28
35/55	38.000	35	29
50/55	36.000	37	31
55/65	34.000	39	33

Plantdiepte: standaard, maaivelddiepte.

Controleer altijd het knolaantal voor een juiste berekening.

Resistenties

Phytophthora loof	55	● ● ● ● ●
Phytophthora knol	74	● ● ● ● ●
Alternaria	65	● ● ● ● ●
Schurft	54	● ● ● ● ●
Poederschurft	55	● ● ● ● ●
Kringerigheid	68	● ● ● ● ●
Y-virus	34	● ● ● ● ●
Yntn-virus knoltolerantie	95	● ● ● ● ●

Aardappelmoetheid

Ro1/4	9	● ● ● ● ●
Ro2/3	4	● ● ● ● ●
Ro5	*5	● ● ● ● ●
Pa2	*6	● ● ● ● ●
Pa3	*1	● ● ● ● ●

Wratziekte

F1	10	● ● ● ● ●
F2	3	● ● ● ● ●
F6	3	● ● ● ● ●
F18	*2	● ● ● ● ●


* HZPC eigen meting / Geen officiële meting

Bemesting

- Pas de bemesting aan op basis van de resultaten van de bodemanalyse.
- Raadpleeg altijd de lokale en huidige regels over gewasbemesting.
- Deelgift wordt aanbevolen, 4/5 voor het planten en 1/5 na het planten.
- Stikstof (N) : Normale dosering (170-210Kg N/ha inclusief bodemvoorraad)
- Op kali-arme gronden chloorhoudende kali (KCl) net voor het planten toedienen om stootblauw te voorkomen.
- Fosfaat (P) : volgens standaard advies.



Teeltadvies Consumptieteelt **TRADITIONAL FRESH**



Voorbehandeling en poten

- SIFRA is geschikt voor alle grondsoorten.
- Op kleigronden is een goede structuur noodzakelijk, om misvormde knollen te voorkomen.
- Vermijd gronden met risico op poederschurft.
- Kan worden geplant in het witte puntjes stadium. Voorkiemen kan de teelt vervroegen.
- Volg de geadviseerde plantafstanden op; SIFRA geeft een hoog aantal knollen per plant.




Teelt

- Gebruik producten die effect hebben op *Alternaria solani* en *alternata*.
- Houd een strak spuitschema aan, vanwege gevoeligheid voor *Phytophthora* in loof.



Loofdding en oogst

- Een niet afgeharde schil heeft een negatieve invloed op de bewaring.
- Zorg voor een afgerijpt gewas en voldoende afgeharde knollen tijdens oogst.
- Een hoog drogestofgehalte en koude omstandigheden tijdens de oogst verhogen de kans op stootblauw.
- Voorkom mechanische beschadiging, om bewaarbaarheid te verbeteren.



Bewaring

- Geschikt voor lange bewaring.
- Goede wondheling is essentieel omdat SIFRA vrij gevoelig is voor *Fusarium*.
- SIFRA is licht gevoelig voor *Phoma*. Let op de wondheling. Een snelle temperatuurdaling verhoogt het risico op *Phoma*.
- Een stabiele temperatuur tijdens de bewaring, voorkomt de uitbreiding van zilverscurft.