



Teeltadvies Consumptieteelt TRADITIONAL FRESH

- Grove knollen
- Hoge opbrengst
- Brede aanpassing aan weersomstandigheden
- Goede droogte- en hittetolerantie
- Goed drogestofgehalte



Landbouwkundige eigenschappen

Rijptijd	64	Midden laat
Kiemrust	56	Gemiddeld
Opbrengst groen	118	Zeer hoog
Opbrengst rijp	114	Hoog
Grofheid	85	Grof
Knolvorm		Lang-ovaal
Knolaantal		9-11
Schilkleur		Geel
Vleeskleur na koken		Licht geel
Kooktype		B - iets kruimig
Droge stof/Zetmeel %		19,9% / 14%
OWG/Soortelijk gewicht		363 / 1,077
Blauwgevoeligheid	14	Vrij gevoelig
Sencor gevoeligheid	75	● ● ● ● ●
Onderzeeërvorming	50	● ● ● ● ●



Schil- en vleeskleur



Kooktype



Rijptijd

Plantafstanden

Maat	Knollen/ha	Rijafstand	
		75 cm	90 cm
28/35	45.000	30	25
35/45	42.000	32	26
35/55	40.000	33	28
50/55	38.000	35	29
55/65	36.000	37	31

Plantdiepte: standaard, maaivelddiepte.

Controleer altijd het knolaantal voor een juiste berekening.

Resistenties

Phytophthora loof	42	● ● ● ● ●
Phytophthora knol	47	● ● ● ● ●
Alternaria	64	● ● ● ● ●
Schurft	48	● ● ● ● ●
Poederschurft	52	● ● ● ● ●
Kringerigheid	91	● ● ● ● ●
Y-virus	19	● ● ● ● ●
Yntn-virus knoltolerantie	85	● ● ● ● ●

Aardappelmoetheid		Wratziekte	
Ro1/4 *3	● ● ● ● ●	F1 10	● ● ● ● ●
Ro2/3 *1	● ● ● ● ●	F2	● ● ● ● ●
Ro5 *1	● ● ● ● ●	F6	● ● ● ● ●
Pa2 2	● ● ● ● ●	F18	● ● ● ● ●
Pa3 2	● ● ● ● ●		

* HZPC eigen meting / Geen officiële meting

Bemesting

- Pas de bemesting aan op basis van de resultaten van de bodemanalyse.
- Raadpleeg altijd de lokale en huidige regels over gewasbemesting.
- Een gedeelde gift voorkomt explosieve loofgroei.
- Stikstof (N) : Erg hoge dosering (>250Kg N/ha inclusief bodemvoorraad)
- Fosfaat (P) en Kalium (K) : volgens standaard advies.
- Organische bemesting heeft een positief effect op de opbrengst.
- SPUNTA is gevoelig voor magnesiumtekort, aanvullende magnesiumbemesting wordt geadviseerd



Teeltadvies Consumptieteelt **TRADITIONAL FRESH**



Voorbehandeling en poten

- Niet afkiemen om onderzeeërvorming te voorkomen.
- Om voldoende ogen los te laten komen moet het pootgoed opgewarmd worden.
- Zorg voor een goed afgeharde korte kiem, om kiembreuk te voorkomen.
- SPUNTA reageert goed op het snijden van de grote potermaat. Het beste resultaat wordt verkregen bij 3-4 weken voor het planten.
- SPUNTA is geschikt voor alle grondsoorten.
- Op kleigronden is een goede structuur noodzakelijk, om misvormde knollen te voorkomen.
- SPUNTA kan vroeg geplant worden, maar vermijd poten onder koude omstandigheden.




Teelt

- SPUNTA heeft een vroege knolzetting.
- De knolzetting is laag en knollen worden snel grof.
- Houd een strak spuitschema aan, vanwege gevoeligheid voor Phytophthora in loof en knol.



Loofdding en oogst

- In het algemeen laten de knollen goed los en is SPUNTA vroeg huidvast.
- SPUNTA is vrij gevoelig voor stootblauw en rooibeschatiging. Beperk de valhoogte en voorkom mechanische beschadiging.
- De schil moet volledig zijn afgehard voordat er kan worden geoogst.
- SPUNTA is vrij gevoelig voor stootblauw. Beperk de valhoogte en voorkom mechanische beschadiging.
- Voorkom mechanische beschadiging, om bewaarbaarheid te verbeteren.



Bewaring

- Geschikt voor lange bewaring.
- Goede wondheling is essentieel omdat SPUNTA vrij gevoelig is voor Fusarium.