




Teeltadvies Consumptieteelt Frankrijk

- Vroege rijptijd met vroege knolzetting
- Regelmatige sortering en knolvorm
- Weinig gevoelig voor stootblauw
- Zeer goede smaak
- Geschikt voor (thuis)frites



Landbouwkundige eigenschappen

Rijptijd	81	Vroeg
Kiemrust	60	Gemiddeld
Opbrengst rijp	95	Goed
Grofheid	81	Grof
Knolvorm		Rond-ovaal / Ovaal
Knolaantal		9-11
Schilkleur		Geel
Vleeskleur na koken		Geel
Kooktype		B - iets kruimig
Droge stof/Zetmeel %		18,4% / 12,6%
OWG/Soortelijk gewicht		333 / 1,071
Blauwgevoeligheid	3	Niet gevoelig
Sencor gevoeligheid	57	● ● ● ● ●
Onderzeeërvorming	72	● ● ● ● ●



Schil- en vleeskleur



Kooktype



Rijptijd

Plantafstanden

Markt: 40-65 mm.

Maat	Knollen/ha	Rijafstand	
		75 cm	90 cm
28/35	45.000	30	25
35/45	38.000	35	29
45/50	36.000	37	31

Plantdiepte: standaard, maaivelddiepte.

Controleer altijd het knolaantal voor een juiste berekening.

Resistenties

Phytophthora loof	32	● ● ● ● ●
Phytophthora knol	68	● ● ● ● ●
Alternaria	40	● ● ● ● ●
Schurft	63	● ● ● ● ●
Poederschurft	58	● ● ● ● ●
Krangerigheid	95	● ● ● ● ●
Y-virus	46	● ● ● ● ●
Yntn-virus knoltolerantie	99	● ● ● ● ●

Aardappelmoetheid

Ro1/4	9	● ● ● ● ●
Ro2/3	*5	● ● ● ● ●
Ro5	*3	● ● ● ● ●
Pa2		● ● ● ● ●
Pa3		● ● ● ● ●

Wratziekte

F1	*1	● ● ● ● ●
F2	*1	● ● ● ● ●
F6	*1	● ● ● ● ●
F18	*1	● ● ● ● ●


* HZPC eigen meting / Geen officiële meting

Bemesting

- Pas de bemesting aan op basis van de resultaten van de bodemanalyse.
- Raadpleeg altijd de lokale en huidige regels over gewasbemesting.
- Stikstof (N) : Hoge dosering (210-250Kg N/ha inclusief bodemvoorraad)
- Deelgift wordt aanbevolen, 2/3 voor het planten en 1/3 na knolzetting.
- Fosfaat (P) en Kalium (K) : volgens standaard advies.



Teeltadvies Consumptieteelt Frankrijk




Voorbehandeling en poten

- SUNITA heeft een goede kiemrust.
- Een warmtestoot is gewenst om de kiemrust te doorbreken.
- Bewaar het pootgoed niet kouder dan 5 °C. Warm voldoende op voor het poten.
- Behandel SUNITA pootgoed altijd tegen Rhizoctonia.
- SUNITA is geschikt voor alle grondsoorten.
- Zorg voor een goede rugopbouw om groene knollen te voorkomen.




Teelt

- De opkomst is een beetje traag, later ontwikkelt het loof zich goed.
- SUNITA is gevoelig voor metribuzin, kan alleen voor opkomst gespoten worden.
- Beregening zorgt voor een gelijkmatiger product en een betere kookkwaliteit.
- Te veel beregenen laat in het seizoen, vergroot de kans op dominante lenticellen.
- Houd een strak spuitschema aan, vanwege gevoeligheid voor Phytophthora in loof.



Loofdoding en oogst

- Streef naar een onderwatergewicht van 325 gram.
- SUNITA kan geoogst worden na 75 - 90 dagen.
- Minimaal 3 weken tussen loofding en rooien voor een goede huidvastheid.
- Voor de vroege eeltgebeden: Houdt minimaal 2 weken aan tussen doodmaken en oogsten.
- SUNITA is weinig gevoelig voor stootblauw. Wees wel alert als er onder extreme omstandigheden gerooid wordt.
- Rooi alleen wanneer bodemcondities optimaal zijn.



Bewaring

- SUNITA heeft een goede kiemrust, luchtkoeling kan worden gebruikt voor de eerste maanden na de oogst.
- Voor bewaring langer dan 3 maanden is mechanische koeling vereist.
- Verlaag de temperatuur 0,5-0,7 °C per dag naar een stabiele waarde, niet lager dan 5°C.
- Ventileer kort maar regelmatig om CO2-ophoping te voorkomen.
- Elke temperatuurschommeling gecombineerd met condens kan resulteren in vroege kieming en een hoog risico op zilverscurft.
- SUNITA heeft een lange kiemrust. Kiemremmingmiddelen zijn alleen nodig voor late leveringen.