




Teeltadvies Consumptieteelt RF

- Vroeg met donkergeel vlees
- Regelmatige sortering en knolvorm
- Weinig gevoelig voor stootblauw
- Geschikt voor (thuis)frites
- Hoge resistentie tegen kringerigheid



Landbouwkundige eigenschappen

Rijptijd	81	Vroeg
Kiemrust	60	Gemiddeld
Opbrengst rijp	95	Goed
Grofheid	81	Grof
Knolvorm		Rond-ovaal / Ovaal
Knolaantal		9-11
Schilkleur		Geel
Vleeskleur na koken		Geel
Kooktype		B - iets kruimig
Droge stof/Zetmeel %		18,4% / 12,6%
OWG/Soortelijk gewicht		333 / 1,071
Blauwgevoeligheid	3	Niet gevoelig
Sencor gevoeligheid	57	● ● ● ● ●
Onderzeeërvorming	72	● ● ● ● ●



Schil- en vleeskleur



Kooktype



Rijptijd

Plantafstanden

Markt: 40-65 mm.

Maat	Knollen/ha	Rijafstand	
		75 cm	90 cm
28/35	65.000	21	17
35/45	52.000	26	21
45/55	40.000	33	28
50/60	36.000	37	31

Plantdiepte: standaard, maaivelddiepte.

Controleer altijd het knolaantal voor een juiste berekening.

Resistenties

Phytophthora loof	32	● ● ● ● ●
Phytophthora knol	68	● ● ● ● ●
Alternaria	40	● ● ● ● ●
Schurft	63	● ● ● ● ●
Poederschurft	58	● ● ● ● ●
Kringerigheid	95	● ● ● ● ●
Y-virus	46	● ● ● ● ●
Yntn-virus knoltolerantie	99	● ● ● ● ●

Aardappelmoetheid

Ro1/4	9	● ● ● ● ●
Ro2/3	*5	● ● ● ● ●
Ro5	*3	● ● ● ● ●
Pa2		● ● ● ● ●
Pa3		● ● ● ● ●

Wratziekte

F1	*1	● ● ● ● ●
F2	*1	● ● ● ● ●
F6	*1	● ● ● ● ●
F18	*1	● ● ● ● ●


* HZPC eigen meting / Geen officiële meting

Bemesting

- Pas de bemesting aan op basis van de resultaten van de bodemanalyse.
- De stikstof in één keer toedienen.
- N-gift: 110% vergeleken met andere vroege rassen.
- Fosfaat (P) en Kalium (K) : volgens standaard advies.



Teeltadvies Consumptieteelt RF



Voorbehandeling en poten

- SUNITA heeft een goede kiemrust.
- Een warmtestoot is gewenst om de kiemrust te doorbreken.
- Bewaar het pootgoed niet kouder dan 5 °C. Warm voldoende op voor het poten.
- SUNITA is geschikt voor alle grondsoorten.




Teelt

- De opkomst is een beetje traag, later ontwikkelt het loof zich goed.
- Het gebruik van metribuzin wordt voor opkomst geadviseerd. Gebruik na opkomst het lage doseringssysteem.
- De weersomstandigheden hebben een grote invloed op de effectiviteit van metribuzin, pas de dosering aan de weersomstandigheden aan.
- Beregening kan het knolaantal aanzienlijk verhogen.
- Te veel beregenen laat in het seizoen, vergroot de kans op dominante lenticellen.
- Een te hoge stikstofgift heeft een hogere gevoeligheid voor Phytophthora tot gevolg.
- Houd een strak spuitschema aan, vanwege gevoeligheid voor Phytophthora in loof.



Loofdoding en oogst

- Streef naar een onderwatergewicht van 325 gram.
- De knolgroei kan snel gaan aan het einde van het groeiseizoen, controleer regelmatig voor het optimale moment van loofdoding.
- SUNITA kan geoogst worden na 75 - 90 dagen.
- Om het risico op rot te vermijden, oogst bij een bodemtemperatuur lager dan 25°C.
- Indien de temperatuur boven de 25°C is; rooi dan alleen vroeg in de morgen/ 's nachts.



Bewaring

- SUNITA is een vroeg ras, afzet vindt meestal binnen 2 maanden na de oogst plaats.
- Product gerooid onder goede omstandigheden, kan na de wondheling snel worden gekoeld.
- SUNITA heeft een goede kiemrust, luchtkoeling kan worden gebruikt voor de eerste maanden na de oogst.
- **MECHANISCHE KOELING**
- Voorkom uitdroging; koel met een klein verschil tussen de koellucht en producttemperatuur.
- Verlaag de temperatuur 0,5-0,7 °C per dag naar een stabiele waarde, niet lager dan 4°C.
- Ventileer kort maar regelmatig om CO2-ophoping te voorkomen.
- Elke temperatuurschommeling gecombineerd met condens kan resulteren in vroege kieming en een hoog risico op zilverscurft.