




Teeltadvies Consumptieteelt Groot-Brittannië MAINCROP BAKER

- Donkergeel vlees
- Regelmatige sortering en knolvorm
- Vroege rijptijd met vroege knolzetting
- Weinig gevoelig voor stootblauw
- Zeer goede smaak



Landbouwkundige eigenschappen

Rijptijd	81	Vroeg
Kiemrust	60	Gemiddeld
Opbrengst rijp	95	Goed
Grofheid	81	Grof
Knolvorm		Rond-ovaal / Ovaal
Knolaantal		9-11
Schilkleur		Geel
Vleeskleur na koken		Geel
Kooktype		B - iets kruimig
Droge stof/Zetmeel %		18,4% / 12,6%
OWG/Soortelijk gewicht		333 / 1,071
Blauwgevoeligheid	3	Niet gevoelig
Sencor gevoeligheid	57	● ● ● ● ●
Onderzeeërvorming	72	● ● ● ● ●



Schil- en vleeskleur



Kooktype



Rijptijd

Plantafstanden

		Rijfstand	
Maat	Knollen/ha	75 cm	90 cm

Resistenties

Phytophthora loof	32	● ● ● ● ●
Phytophthora knol	68	● ● ● ● ●
Alternaria	40	● ● ● ● ●
Schurft	63	● ● ● ● ●
Poederschurft	58	● ● ● ● ●
Kringerigheid	95	● ● ● ● ●
Y-virus	46	● ● ● ● ●
Yntn-virus knoltolerantie	99	● ● ● ● ●

Aardappelmoetheid	
Ro1/4 9	● ● ● ● ●
Ro2/3 *5	● ● ● ● ●
Ro5 *3	● ● ● ● ●
Pa2	● ● ● ● ●
Pa3	● ● ● ● ●

Wratziekte	
F1 *1	● ● ● ● ●
F2 *1	● ● ● ● ●
F6 *1	● ● ● ● ●
F18 *1	● ● ● ● ●


* HZPC eigen meting / Geen officiële meting

Bemesting

- Pas de bemesting aan op basis van de resultaten van de bodemanalyse.
- Nutrient Management Gids (RB209), Groep 2
- Deelgift wordt aanbevolen, 2/3 voor het planten en 1/3 na knolzetting.
- Fosfaat (P) en Kalium (K) : volgens standaard advies.
- Organische mest helpt om een gewas vitaal te behouden.
- Extra attentie voor mangaan en magnesium bladbemesting.
- Vloeibare meststoffen met sporenelementen kunnen gecombineerd worden met de phytophthorabespuiting.



Teeltadvies Consumptieteelt Groot-Brittannië MAINCROP BAKER




Voorbehandeling en poten

- SUNITA heeft een goede kiemrust.
- Bewaar het pootgoed niet kouder dan 5 °C. Warm voldoende op voor het poten.
- Om Rhizoctonia, zilverschurft en andere schimmels te beheersen, worden knol- en/of bodembehandelingen met Azoxystrobine geadviseerd.
- De beste kwaliteit wordt gerealiseerd op vruchtbare en lichte grondsoorten.




Teelt

- Matig dekkend gewas.
- Het gebruik van metribuzin wordt voor opkomst geadviseerd. Gebruik na opkomst het lage doseringssysteem.
- De weersomstandigheden hebben een grote invloed op de effectiviteit van metribuzin, pas de dosering aan de weersomstandigheden aan.
- Beregening kan het knolaantal aanzienlijk verhogen.
- Te veel beregenen laat in het seizoen, vergroot de kans op dominante lenticellen.
- Een te hoge stikstofgift heeft een hogere gevoeligheid voor Phytophthora tot gevolg.
- Houd een strak spuitschema aan, vanwege gevoeligheid voor Phytophthora in loof.



Loofdding en oogst

- De knolgroei kan snel gaan aan het einde van het groeiseizoen, controleer regelmatig voor het optimale moment van loofdding.
- SUNITA kan geoogst worden na 90-100 dagen.
- Zorg voor een korte periode tussen loofdding en oogst om een goede heldere schilkwiteit te behouden.
- SUNITA is weinig gevoelig voor stootblauw. Wees wel alert als er onder extreme omstandigheden gerooid wordt.



Bewaring

- SUNITA heeft een goede kiemrust, luchtkoeling kan worden gebruikt voor de eerste maanden na de oogst.
- Bewaar temperatuur: 4 °C.
- MECHANISCHE KOELING
- Indien onder normale omstandigheden wordt geoogst, kan terugkoelen vlot worden gestart (ca 3 dagen) na de eerste wondheling. Een koel en droog product voorkomt infectie en uitbreiding van zilverschurft.
- Voorkom uitdroging; koel met een klein verschil tussen de koellucht en producttemperatuur.
- Verlaag de temperatuur 0,5-0,7 °C per dag naar een stabiele waarde, niet lager dan 4°C.
- Ventileer kort maar regelmatig om CO2-ophoping te voorkomen.
- Elke temperatuurschommeling gecombineerd met condens kan resulteren in vroege kieming en een hoog risico op zilverschurft.

- **Hoge resistentie tegen kringerigheid**
- **Goede bewaarbaarheid**

