




Produção de batata de consumo France

- **Maturação e tuberização precoces**
- **Calibre e forma dos tubérculos uniformes**
- **Boa tolerância a golpes**
- **Sabor muito bom**
- **Adequada para batata frita (palitos)**



Propriedades agronômicas

Maturação	81	Precoce
Periodo de dormencia	60	Medio
Produto final maturação	95	Bom
Tamanho tubérculos	81	Grande calibre
Forma dos tubérculos		Redondo-oval / Oval
Numero de tubérculos		9-11
Cor da pele		Amarela
Polpa após cozinhar		Amarela
Tipo culinário		B - Moderadamente farinif
Peso de matéria seca/Aln		18,4% / 12,6%
Teor de matéria seca/Pes		333 / 1,071
Enegrecimento interno	3	Não sensível
Sens. ao Metribuzin	57	● ● ● ● ●
Formacao de Batatinhas	72	● ● ● ● ●



Cor da pele e carne



Tipo culinário



Maturação

Densidade de Plantação

Mercado: 40-65 mm.

Calibre	Densidade de plantação/ha	Distancia entre linhas	
		75 cm	90 cm
28/35	45.000	30	25
35/45	38.000	35	29
45/50	36.000	37	31

Profundidade de plantação: normal.

Verificar sempre a contagem de tubérculos para um cálculo correto.

Resistências

Mildio da folha	32	● ● ● ● ●
Mildio do tuberculo	68	● ● ● ● ●
Alternaria	40	● ● ● ● ●
Sarna comum	63	● ● ● ● ●
Sarna pulvuro lenta	58	● ● ● ● ●
Spraing	95	● ● ● ● ●
PVY	46	● ● ● ● ●
Yntn tolerancia tubérculos	99	● ● ● ● ●

Res. aos nematodos

Ro1/4	9	● ● ● ● ●
Ro2/3	*5	● ● ● ● ●
Ro5	*3	● ● ● ● ●
Pa2		● ● ● ● ●
Pa3		● ● ● ● ●

Res. verruga

F1	*1	● ● ● ● ●
F2	*1	● ● ● ● ●
F6	*1	● ● ● ● ●
F18	*1	● ● ● ● ●

* HZPC own analysis/no official analysis

Fertilização

- Adaptar a fertilização em função das análises do solo.
- Consulte sempre as regras locais atuais sobre a fertilização das culturas.
- Azoto (N): Aplicação elevada (210-250Kg N/ha incluindo a disponibilidade no solo).
- Aplicar 2/3 antes da plantação e 1/3 na cobertura.
- Adubação com Potássio e Fosfatos de acordo com a recomendação padrão.



Produção de batata de consumo France



Preparação e Plantação

- SUNITA tem uma boa dormência.
- Um tratamento térmico é o ideal para quebrar a dormência.
- Não armazenar as batatas de semente a temperaturas inferiores a 5 °C. Aquecer suficientemente antes da plantação.
- Tratar sempre as sementes de SUNITA e o solo contra Rhizoctonia.
- SUNITA pode ser cultivada em todos os tipos de solo.
- Uma boa amontoa evita o aparecimento de tubérculos verdes.




Cultivo

- A emergência é um pouco lenta, posteriormente a planta desenvolve-se bem.
- SUNITA é muito sensível à Metribuzina, aplicar apenas em pré-emergência.
- Irrigação resulta num produto mais uniforme e com melhor qualidade culinária.
- A irrigação excessiva na parte final da cultura aumenta a dominância de lenticelas.
- Utilizar um plano de tratamentos, devido ao elevado risco do Míldio da folha.



Defenagem e Colheita

- Para obter teor de matéria seca de 18 %.
- O arranque do SUNITA pode ser feito após 75-90 dias.
- Mínimo de 3 semanas entre a desecagem das plantas e o arranque para ter uma pele completamente firme.
- Nas áreas iniciais : mínimo de 3 semanas entre a desecagem das plantas e o arranque para ter uma pele completamente firme.
- SUNITA é muito resistente a golpes, exceto em condições extremas.
- Proceda ao arranque quando as condições do solo forem ótimas.



Armazenamento

- SUNITA tem uma boa dormência, pelo que pode ser efetuado um armazenamento à temperatura ambiente nos primeiros meses posteriores à colheita.
- Para um armazenamento superior a 3 meses, é necessária refrigeração.
- Reduzir a temperatura 0,5 °C-0,7 °C por dia, até um valor estável, nunca inferior a 5 °C.
- Ventilar com regularidade para evitar acumulação de CO2.
- Qualquer alteração da temperatura, em combinação com condensação, pode resultar num abrolhamento precoce e num elevado risco de aparecimento de Sarna prateada.
- SUNITA tem uma dormência longa. O anti-abrolhante só é necessário armazenamentos a longo prazo.