




## Produção de batata de consumo United Kingdom MAINCROP BAKER

- Polpa amarela escura
- Calibre e forma dos tubérculos uniformes
- Maturação e tuberização precoces
- Boa tolerância a golpes
- Sabor muito bom



### Propriedades agronômicas

Maturação	81	Precoce
Período de dormência	60	Medio
Produto final maturação	95	Bom
Tamanho tubérculos	81	Grande calibre
Forma dos tubérculos		Redondo-oval / Oval
Numero de tubérculos		9-11
Cor da pele		Amarela
Polpa após cozinhar		Amarela
Tipo culinário		B - Moderadamente farinô
Peso de matéria seca/Aln		18,4% / 12,6%
Teor de matéria seca/Pes		333 / 1,071
Enegrecimento interno	3	Não sensível
Sens. ao Metribuzin	57	●●●●●●
Formação de Batatinhas	72	●●●●●●



Cor da pele e carne



Tipo culinário



Maturação

### Densidade de Plantação

	Distancia entre linhas	
Calibre	Densidade de plantação/ha	75 cm 90 cm

### Resistências

Mildio da folha	32	●●●●●●
Mildio do tuberculo	68	●●●●●●
Alternaria	40	●●●●●●
Sarna comum	63	●●●●●●
Sarna pulvuro lenta	58	●●●●●●
Spraing	95	●●●●●●
PVY	46	●●●●●●
Yntn tolerancia tubérculos	99	●●●●●●
Res. aos nematodos		
Ro1/4 9		●●●●●●
Ro2/3 *5		●●●●●●
Ro5 *3		●●●●●●
Pa2		●●●●●●
Pa3		●●●●●●
Res. verruga		
F1 *1		●●●●●●
F2 *1		●●●●●●
F6 *1		●●●●●●
F18 *1		●●●●●●

\* HZPC own analysis/no official analysis

### Fertilização

- Adaptar a fertilização em função das análises do solo.
- Aplicar 2/3 antes da plantação e 1/3 na cobertura.
- Adubação com Potássio e Fosfatos de acordo com a recomendação padrão.
- A matéria orgânica ajuda a manter o vigor da cultura.
- O Manganês e o Magnésio fortalecem a folhagem e previnem a morte prematura.
- Um fertilizante líquido com oligoelementos pode ser combinado com fungicidas contra o Míldio.



## Produção de batata de consumo United Kingdom MAINCROP BAKER



### Preparação e Plantação

- SUNITA tem uma boa dormência.
- Não armazenar as batatas de semente a temperaturas inferiores a 5 °C. Aquecer suficientemente antes da plantação.
- Aconselha-se o tratamento da semente e do solo para o controlo da Rhizoctonia, sarna prateada e outros problemas de pele que possam aparecer. A Azoxistrobina é um produto de aplicação com bons resultados contra o aparecimento de muitos fungos.
- A melhor qualidade obtém-se em solos férteis leves.




### Cultivo

- SUNITA cobre moderadamente o terreno.
- Recomenda-se a utilização de Metribuzina em pré-emergência. Em caso de pós-emergência, utilizar doses mais baixas.
- "As condições climatéricas têm uma forte influência no efeito da Metribuzina
- Irrigação pode aumentar substancialmente o número de tubérculos.
- A irrigação excessiva na parte final da cultura aumenta a dominância de lenticelas.
- Uma sobredosagem de Azoto (N) resultará numa maior sensibilidade ao Míldio.
- Utilizar um plano de tratamentos, devido ao elevado risco do Míldio da folha.



### Defenagem e Colheita

- Os tubérculos podem crescer muito rapidamente no final do ciclo, verificar regularmente.
- O arranque do SUNITA pode ser feito após 90-100 dias.
- Para que a pele dos tubérculos se mantenha brilhante e lisa, estes não devem ficar muito tempo no solo após a dessecagem.
- SUNITA é muito resistente a golpes, exceto em condições extremas.



### Armazenamento

- SUNITA tem uma boa dormência, pelo que pode ser efetuado um armazenamento à temperatura ambiente nos primeiros meses posteriores à colheita.
- Temperatura de armazenamento: 4 °C.
- ARMAZENAMENTO EM CÂMARA FRIGORIFICA
- Em condições normais de arranque, o arrefecimento pode ser feito após 3 dias de tratamento. Um produto fresco e seco é menos sensível à sarna prateada.
- Prevenir a desidratação, arrefecer com uma pequena diferença entre o ar de refrigeração e a temperatura do produto.
- Reduzir a temperatura 0,5 °C-0,7 °C por dia, nunca inferior a 4 °C.
- Ventilar com regularidade para evitar acumulação de CO2.
- Qualquer alteração da temperatura, em combinação com condensação, pode resultar num abrolhamento precoce e num elevado risco de aparecimento de Sarna prateada.

- **Alta resistência ao vírus TRV- PMTV**
- **Boa capacidade de Armazenamento**

