




Consejos generales para la producción de consumo

- **Maduración y tuberización temprana**
- **Piel brillante muy atractiva**
- **Tubérculos de tamaño y forma uniformes**
- **Bonita carne amarilla**
- **Buen almacenamiento**



Propiedades agronómicas

Maduración	83	Muy temprana
Período de dormencia	60	Medio
Producción	96	Bien
Tamaño del tubérculo	73	Calibre pequeño
Forma		Oval / Alargada-oval
Número de tubérculos		12-14
Color de piel		Amarilla
Color carne cocinar		Amarilla
Tipo de cocción		A - Firme
Materia seca/Almidón %		18,1% / 12,3%
/Peso específico		327 / 1,069
Golpeo interno	4	No sensible
Sens. Metribuzin	55	● ● ● ● ●
Fenómeno patatitas	84	● ● ● ● ●



Color de piel y carne



Tipo de cocción



Maduración

Densidad de plantación

Calibre comercial: 35-55 mm.

Calibre	Densidad de plantación/ha	Distancia entre caballones	
		75 cm	90 cm
35/55	38.000	35	29

Profundidad de plantación: normal.

Resistencias

Mildíu en planta	47	● ● ● ● ●
Mildíu en el tubérculo	55	● ● ● ● ●
Alternaria	52	● ● ● ● ●
Sarna común	61	● ● ● ● ●
Sarna verrugosa	58	● ● ● ● ●
Spraing	96	● ● ● ● ●
Virus Y	36	● ● ● ● ●
Tol. Yntn tubérculo	99	● ● ● ● ●

Res. a nemátodos

Ro1/4	9	● ● ● ● ●
Ro2/3	*5	● ● ● ● ●
Ro5	*1	● ● ● ● ●
Pa2		● ● ● ● ●
Pa3		● ● ● ● ●

Roña

F1	*1	● ● ● ● ●
F2		● ● ● ● ●
F6	*5	● ● ● ● ●
F18		● ● ● ● ●

* Datos internos de HZPC / No probado por un Organismo oficial

Fertilización

- Adaptar el abonado a los análisis del suelo.
- Nitrógeno (N): 110 % en comparación con otras variedades tempranas.
- Fertilización con potasio y fósforo como recomendación general.
- Manténgase la planta vigorosa.



Consejos generales para la producción de consumo



Cultivo

- SUNNY tiene una dormencia media.
- Se recomienda tratar el tubérculo contra rizoctonia, sarna plateada y otras enfermedades de la piel.
- La mejor calidad se obtiene en terrenos fértiles y ligeros.
- Prestar atención a la estructura del suelo
- No es necesaria la prebrotación, SUNNY se puede plantar con pequeñas yemas blanquecinas.
- Los mejores resultados se obtienen bajo condiciones de regadío.




Período de cultivo

- La emergencia es uniforme, con un buen desarrollo de la planta.
- SUNNY cubre moderadamente el terreno.
- SUNNY es muy sensible a metribuzin, usarlo solo en preemergencia.
- Se aconseja el riego en condiciones de sequía.
- Usar productos que tengan efecto en Alternaria solani y Alternaria alternata.
- Se aconsejan pulverizaciones preventivas contra Phytophthora.



Destrucción de las plantas

- Los tubérculos tienen una rápida pero fina fijación de la piel, prestar atención especial en la cosecha.



Almacenamiento

- SUNNY es una variedad temprana y, por lo tanto su venta se realiza normalmente durante los cinco meses posteriores a la cosecha.
- Tener cuidado con el período de curación de las heridas.
- Temperatura de almacenamiento: 4 °C.
- Unas temperaturas estables durante el almacenamiento evitan el desarrollo de sarna plateada.