




Algemeen Teeltadvies Consumptieteelt

- Vroege rijptijd met een vroege knolzetting
- Erg mooie heldere schil
- Regelmatige sortering en knolvorm
- Mooi gele vleeskleur
- Goede bewaarbaarheid



Landbouwkundige eigenschappen

Rijptijd	83	Zeer vroeg
Kiemrust	60	Gemiddeld
Opbrengst rijp	96	Goed
Grofheid	73	Fijn
Knolvorm		Ovaal / Lang-ovaal
Knolaantal		12-14
Schilkleur		Geel
Vleeskleur na koken		Geel
Kooktype		A - Vastkokend
Droge stof/Zetmeel %		18,1% / 12,3%
OWG/Soortelijk gewicht		327 / 1,069
Blauwgevoeligheid	4	Niet gevoelig
Sencor gevoeligheid	55	● ● ● ● ●
Onderzeeërvorming	84	● ● ● ● ●



Schil- en vleeskleur



Kooktype



Rijptijd

Plantafstanden

Markt: 35-55 mm.

Maat	Knollen/ha	Rijfstand	
		75 cm	90 cm
35/55	38.000	35	29

Plantdiepte: standaard, maaivelddiepte.

Resistenties

Phytophthora loof	47	● ● ● ● ●
Phytophthora knol	55	● ● ● ● ●
Alternaria	52	● ● ● ● ●
Schurft	61	● ● ● ● ●
Poederschurft	58	● ● ● ● ●
Kringerigheid	96	● ● ● ● ●
Y-virus	36	● ● ● ● ●
Yntn-virus knoltolerantie	99	● ● ● ● ●

Aardappelmoetheid

Ro1/4	9	● ● ● ● ●
Ro2/3	*5	● ● ● ● ●
Ro5	*1	● ● ● ● ●
Pa2		● ● ● ● ●
Pa3		● ● ● ● ●

Wratziekte

F1	*1	● ● ● ● ●
F2		● ● ● ● ●
F6	*5	● ● ● ● ●
F18		● ● ● ● ●


* HZPC eigen meting / Geen officiële meting

Bemesting

- Pas de bemesting aan op basis van de resultaten van de bodemanalyse.
- N-gift: 110% vergeleken met andere vroege rassen.
- Fosfaat (P) en Kalium (K) : volgens standaard advies.
- Zorg ervoor dat het gewas vitaal blijft.



Algemeen Teeltadvies Consumptieteelt



Voorbehandeling en poten

- SUNNY heeft een gemiddelde kiemrust.
- Knolbehandeling wordt aanbevolen om Rhizoctonia en Zilvereschurft en andere grondgebonden ziektes die de schilkwaliteit aantasten, tegen te gaan.
- De beste kwaliteit wordt gerealiseerd op vruchtbare en lichte grondsoorten.
- Zorg voor een goede bodemstructuur
- Voorkiemen is niet nodig, SUNNY kan worden geplant in het witte puntjes stadium.
- Irrigatie wordt geadviseerd




Teelt

- De opkomst is gelijkmatig, met een goede loofontwikkeling.
- Matig dekkend gewas.
- SUNNY is gevoelig voor metribuzin, kan alleen voor opkomst gespoten worden.
- Beregening wordt geadviseerd om het risico op doorwas te verminderen. Start irrigatie voordat de planten een hoogte van 10cm bereiken en behoud een optimale bodemvochtigheid gedurende het groeiseizoen.
- Gebruik producten die effect hebben op Alternaria solani en alternata.
- Preventieve behandeling tegen Phytophthora wordt geadviseerd.



Loofdoding en oogst

- SUNNY heeft een dunne huid, maar is wel snel huidvast.



Bewaring

- SUNNY is een vroeg ras. De afzet vindt meestal binnen 5 maanden na de oogst plaats.
- Wondhelingsperiode in acht nemen.
- Bewaartemperatuur: 4 °C.
- Een stabiele temperatuur tijdens de bewaring, voorkomt de uitbreiding van zilvereschurft.