# SUNNY

ANUSCHKA X HZD 99-1007

## Conselhos gerais na produção de batata de consumo

- **Maturação e tuberização precoces**
- **Pele bastante atrativa e brilhante**
- **Calibre e forma dos tubérculos uniformes**
- **Polpa amarela atrativa**
- **Boa capacidade de Armazenamento**

## Propriedades agronómicas

| | | |
|---|---|---|
| Maturação | 83 | Miuito precoce |
| Periodo de dormencia | 60 | Medio |
| Produto final maturação | 96 | Bom |
| Tamanho tubérculos | 73 | Pequeno |
| Forma dos tubérculos | | Oval / Alongada-oval |
| Numero de tubérculos | | 12-14 |
| Cor da pele | | Amarela |
| Polpa após cozinhar | | Amarela |
| Tipo culinário | | A - Firme |
| Peso de matéria seca/Aln | | 18,1% / 12,3% |
| Teor de matéria seca/Pes | | 327 / 1,069 |
| Enegrecimento interno | 4 | Não sensível |
| Sens. ao Metribuzin | 55 | |
| Formacao de Batatinhas | 84 | |



Cor da pele e carne

Tipo culinário

Maturação

## Densidade de Plantação

Mercado: 35-55 mm.

| Calibre | Densidade de plantação/ha | Distancia entre linhas 75 cm | 90 cm |
|---|---|---|---|
| 35/55 | 38.000 | 35 | 29 |

Profundidade de plantação: normal.

## Resistências

| | | |
|---|---|---|
| Mildio da folha | 47 | |
| Mildio do tuberculo | 55 | |
| Alternaria | 52 | |
| Sarna comum | 61 | |
| Sarna pulvurolenta | 58 | |
| Spraing | 96 | |
| PVY | 36 | |
| Yntn tolerancia tubérculos | 99 | |

| Res. aos nematodos | | Res. verruga | |
|---|---|---|---|
| Ro1/4 | 9 | F1 | *1 |
| Ro2/3 | *5 | F2 | |
| Ro5 | *1 | F6 | *5 |
| Pa2 | | F18 | |
| Pa3 | | | |

* HZPC own analysis/no official analysis

## Fertelização

- Adaptar a fertilização em função das análises do solo.
- Azoto (N): 110% em comparação com outras variedades precoces.
- Adubação com Potássio e Fosfatos de acordo com a recomendação padrão.
- Zelar para que a planta se mantenha vigorosa.

HZPC não assume responsabilidade por quaisquer consequências prejudiciais que possam eventualmente occorrer quando utilizar esta informação 24 Jan 2025
www.hzpc.com

# SUNNY

ANUSCHKA X HZD 99-1007

## Conselhos gerais na produção de batata de consumo



### Preparação e Plantação

- SUNNY tem uma dormência média.
- Aconselha-se o tratamento da semente para o controlo da Rhizoctonia, sarna prateada e outros problemas de pele que possam aparecer.
- A melhor qualidade obtém-se em solos férteis leves.
- Ter em atenção a estrutura do solo
- O pré-abrolhamento não é necessário, SUNNY pode ser plantada com pequenos brolhos brancos.
- Preferência de cultivo com irrigação.



### Cultivo

- Emergência uniforme, com um bom desenvolvimento da folhagem.
- SUNNY cobre moderadamente o terreno.
- SUNNY é muito sensível à Metribuzina, aplicar apenas em pré-emergência.
- Aconselha-se a irrigação em condições secas.
- Utilizar produtos que tenham efeito no controlo da Alternaria solani e da Alternaria alternata.
- Aconselham-se pulverizações preventivas contra o Míldio.

### Defenagem e Colheita

- Os tubérculos têm pele fina, pelo que se deve ter especial atenção no momento do arranque.



### Armazenamento

- SUNNY é uma variedade precoce, pelo que a sua comercialização ocorre normalmente nos 5 meses subsequentes à sua colheita.
- Ter em atenção o período de cicatrização.
- Temperatura de armazenamento: 4 ºC.
- Uma temperatura estável durante o armazenamento previne o desenvolvimento de sarna prateada.

HZPC não assume responsabilidade por quaisquer consequências prejudiciais que possam eventualmente occorrer quando utilizar esta informação 24 Jan 2025
www.hzpc.com