




Teeltadvies Consumptieteelt TRADITIONAL FRESH

- Vroege rijptijd met vroege knolzetting
- Grove knollen
- Goede opbrengst
- Regelmatige sortering en knolvorm
- Goede resistentie tegen schurft



Landbouwkundige eigenschappen

Rijptijd	76	Vroeg
Kiemrust	54	Vrij kort
Opbrengst rijp	104	Vrij hoog
Grofheid	87	Zeer grof
Knolvorm		Ovaal
Knolaantal		6-8
Schilkleur		Donker rood
Vleeskleur na koken		Licht geel
Kooktype		AB - Vrij vastkokend
Droge stof/Zetmeel %		17,7% / 11,9%
OWG/Soortelijk gewicht		319 / 1,067
Blauwgevoeligheid	3	Niet gevoelig
Sencor gevoeligheid	83	● ● ● ● ●
Onderzeeërvorming	79	● ● ● ● ●



Schil- en vleeskleur



Kooktype



Rijptijd

Plantafstanden

Maat	Knollen/ha	Rijfstand	
		75 cm	90 cm
28/35	60.000	22	19
35/45	54.000	25	21
35/55	50.000	27	22
50/55	46.000	29	24
55/65	43.000	31	26

Plantdiepte: standaard, maaivelddiepte.

Controleer altijd het knolaantal voor een juiste berekening.

Resistenties

Phytophthora loof	42	● ● ● ● ●
Phytophthora knol	64	● ● ● ● ●
Alternaria	56	● ● ● ● ●
Schurft	54	● ● ● ● ●
Poederschurft	63	● ● ● ● ●
Kringerigheid	86	● ● ● ● ●
Y-virus	25	● ● ● ● ●
Yntn-virus knoltolerantie	99	● ● ● ● ●

Aardappelmoeheid

Ro1/4 1	● ● ● ● ●
Ro2/3	● ● ● ● ●
Ro5 *1	● ● ● ● ●
Pa2	● ● ● ● ●
Pa3	● ● ● ● ●

Wratziekte

F1 10	● ● ● ● ●
F2 *1	● ● ● ● ●
F6 *1	● ● ● ● ●
F18 *1	● ● ● ● ●

* HZPC eigen meting / Geen officiële meting

Bemesting

- Pas de bemesting aan op basis van de resultaten van de bodemanalyse.
- Raadpleeg altijd de lokale en huidige regels over gewasbemesting.
- Deelgift wordt aanbevolen, 4/5 voor het planten en 1/5 na het planten.
- Stikstof (N) : Hoge dosering (210-250Kg N/ha inclusief bodemvoorraad)
- Chloorkali (KCl) niet minder dan 6 weken voor het planten toepassen, late toediening kan een lager drogestofgehalte veroorzaken.
- Fosfaat (P) en Kalium (K) : volgens standaard advies.



Teeltadvies Consumptieteelt TRADITIONAL FRESH




Voorbehandeling en poten

- SUNRED heeft een korte kiemrust.
- SUNRED is geschikt voor alle grondsoorten.
- SUNRED is weinig gevoelig voor Rhizoctonia.
- Voorkiemen is niet nodig, SUNRED kan worden geplant in het witte puntjes stadium.
- SUNRED is niet gevoelig voor onderzeeërvorming en kan vroeg geplant worden.




Teelt

- SUNRED heeft een vroege knolzetting.
- SUNRED heeft een vlotte opkomst.
- Mooi dekkend gewas.
- SUNRED heeft een goede tolerantie tegen metribuzin.
- Houd een strak spuitschema aan, vanwege gevoeligheid voor Phytophthora in loof en knol.
- Gebruik producten die effect hebben op Alternaria solani en alternata.



Loofdoding en oogst

- SUNRED heeft een vroege afrijping. Loofvernietiging zal geen problemen geven.
- Voor een optimale kiemrust moet loofdoding plaatsvinden bij een afgerijpt gewas.
- Zorg voor een goed afgerijpt gewas, om het drogestofgehalte te vergroten.
- Zorg voor een korte periode tussen loofdoding en oogst om een goede heldere schilkwaliteit te behouden.



Bewaring

- Vanwege de korte kiemrust moet er extra aandacht worden besteed aan de bewaring.
- Snel drogen en droog houden om zilverschurft te voorkomen.
- Een stabiele temperatuur tijdens de bewaring, voorkomt de uitbreiding van zilverschurft.
- Elke temperatuurschommeling gecombineerd met condens kan resulteren in vroege kieming en een hoog risico op zilverschurft.