




Teeltadvies Consumptieteelt TRADITIONAL FRESH

- Geschikt voor verschillende marktsegmenten
- Grove knollen
- Goede opbrengst
- Regelmatige sortering en knolvorm
- Goede droogtetolerantie



Landbouwkundige eigenschappen

Rijptijd	64	Midden laat
Kiemrust	80	Zeer lang
Opbrengst rijp	105	Hoog
Grofheid	83	Grof
Knolvorm		Rond-ovaal / Ovaal
Knolaantal		9-11
Schilkleur		Geel
Vleeskleur na koken		Geel
Kooktype		B - iets kruimig
Droge stof/Zetmeel %		19,3% / 13,5%
OWG/Soortelijk gewicht		352 / 1,075
Blauwgevoeligheid	14	Vrij gevoelig
Sencor gevoeligheid	78	● ● ● ● ●
Onderzeeërvorming	60	● ● ● ● ●



Schil- en vleeskleur



Kooktype



Rijptijd

Plantafstanden

Maat	Knollen/ha	Rijafstand	
		75 cm	90 cm
28/35	45.000	30	25
35/45	40.000	33	28
35/55	38.000	35	29
50/55	37.000	36	30
55/65	35.000	38	32

Plantdiepte: standaard, maaivelddiepte.

Controleer altijd het knolaantal voor een juiste berekening.

Resistenties

Phytophthora loof	50	● ● ● ● ●
Phytophthora knol	61	● ● ● ● ●
Alternaria	65	● ● ● ● ●
Schurft	65	● ● ● ● ●
Poederschurft	64	● ● ● ● ●
Kringerigheid	73	● ● ● ● ●
Y-virus	27	● ● ● ● ●
Yntn-virus knoltolerantie	99	● ● ● ● ●

Aardappelmoeheid

Ro1/4	8	● ● ● ● ●
Ro2/3	*3	● ● ● ● ●
Ro5	*1	● ● ● ● ●
Pa2	*4	● ● ● ● ●
Pa3	*1	● ● ● ● ●

Wratziekte

F1	10	● ● ● ● ●
F2	6	● ● ● ● ●
F6	7	● ● ● ● ●
F18	*1	● ● ● ● ●

* HZPC eigen meting / Geen officiële meting

Bemesting

- Pas de bemesting aan op basis van de resultaten van de bodemanalyse.
- Raadpleeg altijd de lokale en huidige regels over gewasbemesting.
- Deelgift wordt aanbevolen, 2/3 voor het planten en 1/3 na knolzetting.
- Een gedeelte gift wordt geadviseerd voor een vitaal gewas, dit zal resulteren in grovere knollen.
- Stikstof (N) : Hoge dosering (210-250Kg N/Ha inclusief bodemvoorraad)
- Chloorkali (KCl) niet minder dan 6 weken voor het planten toepassen, late toediening kan een lager drogestofgehalte veroorzaken.
- Een kali (KCL) gift vlak voor de bloei verlaagt de kans op blauwgevoeligheid.



Teeltadvies Consumptieteelt TRADITIONAL FRESH



Voorbehandeling en poten

- Bewaar pootgoed in de mechanische koeling, om fysiologische ouderdom te voorkomen.
- Laat het pootgoed voor het poten acclimatiseren.
- Niet afkiemen om onderzeërvorming te voorkomen.
- Om Rhizoctonia, zilverschurft en andere schimmels te beheersen, worden knol- en/of bodembehandelingen met Azoxystrobine geadviseerd.
- Voor lange bewaring wordt een knolbehandel geadviseerd om zilverschurftaantasting te verminderen.
- Het ras is gevoelig voor onderzeërvorming. Niet planten in koude grond.
- SYLVANA is geschikt voor alle grondsoorten.
- In warme grond planten, niet te vroeg.
- Voorkiemen is niet nodig, SYLVANA kan worden geplant in het witte puntjes stadium.




Teelt

- De opkomst is een beetje traag, later ontwikkelt het loof zich goed.
- SYLVANA heeft een goede droogtetolerantie.
- Gebruik producten die effect hebben op Alternaria solani en alternata.
- Houd een strak spuitschema aan, vanwege gevoeligheid voor Phytophthora in loof.
- Gebruik later in het seizoen middelen met een goede knolbescherming.



Loofdding en oogst

- In het algemeen laten de knollen goed los en is SYLVANA vroeg huidvast.
- SYLVANA is vrij gevoelig voor stootblauw. Beperk de valhoogte en voorkom mechanische beschadiging.
- Voorkom mechanische beschadiging, om bewaarbaarheid te verbeteren.



Bewaring

- SYLVANA heeft een lange kiemrust en is goed te bewaren.
- SYLVANA is licht gevoelig voor Phoma. Let op de wondheling. Een snelle temperatuurdaling verhoogt het risico op Phoma.
- Snel drogen en droog houden om zilverschurft te voorkomen.
- Ventileer kort maar regelmatig om CO₂-ophoping te voorkomen.
- Niet bewaren bij een temperatuur lager dan 5°C.
- Bewaring bij te lage temperatuur veroorzaakt vroege veroudering van de knollen.
- Voorzichtig sorteren. Het ras is gevoelig voor haarscheurtjes.