



Producción de consumo France

- Piel brillante muy atractiva
- Elevada producción
- Buena resistencia a la sequía y el calor
- Muy buen gusto
- Apropiaada para almacenamientos largos

Propiedades agronómicas

Maduración	62	Semi- tardia
Período de dormencia	80	Muy largo
Producción	112	Alta
Tamaño del tuberculo	79	Medio
Forma		Oval
Número de tubérculos		15-17
Color de piel		Amarilla
Color carne cocinar		Amarilla
Tipo de cocion		AB - Ligeramente firme
Materia seca/Almidon %		20,2% / 14,3%
/Peso específico		370 / 1,079
Golpeo interno	14	Bastante sensible
Sens. Metribuzin	69	● ● ● ● ●
Fenómeno patatitas	75	● ● ● ● ●



Color de piel y carne



Tipo de cocion



Maduración

Densidad de plantación

Calibre comercial: 40-75 mm.

Calibre	Densidad de plantación/ha	Distancia entre caballones	
		75 cm	90 cm
28/35	38.000	32	27
35/45	33.000	41	34
45/50	30.000	44	37
50/55	28.000	48	40

Profundidad de plantación: normal.

Comprobar siempre el número de tubérculos para un cálculo exacto.

Resistencias

Mildíu en planta	60	● ● ● ● ●
Mildíu en el tubérculo	70	● ● ● ● ●
Sarna común	56	● ● ● ● ●
Sarna verrugosa	55	● ● ● ● ●
Spraing	81	● ● ● ● ●
Virus Y	10	● ● ● ● ●
Tol. Yntn tubérculo	99	● ● ● ● ●

Res. a nemátodos		Roña	
Ro1/4	9	F1	● ● ● ● ●
Ro2/3	*8	F2	● ● ● ● ●
Ro5	*8	F6	● ● ● ● ●
Pa2	*6	F18	● ● ● ● ●
Pa3			● ● ● ● ●

* Datos internos de HZPC / No probado por un Organismo oficial

Fertilización

- Adaptar el abonado a los análisis del suelo.
-
- Aplicar 2/3 antes de la plantación y 1/3 en cobertera.
- Nitrógeno (N): aporte alto (210-250Kg N/Ha incluido las reservas del suelo).
- Fertilización con potasio y fosfato como recomendación general.
- Para una buena producción asegurarse un aporte adecuado de Azufre.



Producción de consumo France



Cultivo

- TAISIYA tiene una dormencia muy larga.
- Dejar calentar la semilla correctamente y plantar con pequeños brotes blancos.
- Dejar atemperar la semilla un mínimo de 3 semanas.
- Tratar siempre la semilla de TAISIYA contra rizoctonia.
- Plantar en terrenos cálidos, no plantar demasiado pronto.




Período de cultivo

- La emergencia es uniforme, con un buen desarrollo de la planta.
- TAISIYA es muy sensible a metribuzin, usarlo solo en preemergencia.
- TAISIYA tiene una buena tolerancia a la sequía.



Destrucción de las plantas

- Mínimo tres semanas entre el quemado y la recogida para un correcto fijado de la piel.
- TAISIYA es muy resistente al golpeo, a menos que se produzcan condiciones extremas.



Almacenamiento

- Con un manejo adecuado de almacén, es posible conservar Tiger por largos periodos.
- Temperatura de almacenamiento: 4 °C.
- Reducir la temperatura en 0,5-0,7 °C por día hasta un valor estable que no sea inferior a 4 °C.
- Ventilar de forma regular pero breve para prevenir la acumulación de CO2.
- Como TAISIYA tiene una dormencia larga, es posible almacenajes a largo plazo, a bajas temperaturas sin utilizar inhibidores.