



## Teeltadvies Consumptieteelt Frankrijk

- Zeer mooie heldere schil
- Hoge opbrengst
- Goede droogte- en hittetolerantie
- Zeer goede smaak
- Geschikt voor lange bewaring

### Landbouwkundige eigenschappen

|                        |     |                      |
|------------------------|-----|----------------------|
| Rijptijd               | 62  | Midden laat          |
| Kiemrust               | 80  | Zeer lang            |
| Opbrengst rijp         | 112 | Hoog                 |
| Grofheid               | 79  | Gemiddeld            |
| Knolvorm               |     | Ovaal                |
| Knolaantal             |     | 15-17                |
| Schilkleur             |     | Geel                 |
| Vleeskleur na koken    |     | Geel                 |
| Kooktype               |     | AB - Vrij vastkokend |
| Droge stof/Zetmeel %   |     | 20,2% / 14,3%        |
| OWG/Soortelijk gewicht |     | 370 / 1,079          |
| Blauwgevoeligheid      | 14  | Vrij gevoelig        |
| Sencor gevoeligheid    | 69  | ● ● ● ● ●            |
| Onderzeeërvorming      | 75  | ● ● ● ● ●            |



Schil- en vleeskleur



Kooktype



Rijptijd

### Plantafstanden

Markt: 40-75 mm.

| Maat  | Knollen/ha | Rijafstand |       |
|-------|------------|------------|-------|
|       |            | 75 cm      | 90 cm |
| 28/35 | 38.000     | 32         | 27    |
| 35/45 | 33.000     | 41         | 34    |
| 45/50 | 30.000     | 44         | 37    |
| 50/55 | 28.000     | 48         | 40    |

Plantdiepte: standaard, maaivelddiepte.

Controleer altijd het knolaantal voor een juiste berekening.

### Resistenties

|                           |    |           |
|---------------------------|----|-----------|
| Phytophthora loof         | 60 | ● ● ● ● ● |
| Phytophthora knol         | 70 | ● ● ● ● ● |
| Schurft                   | 56 | ● ● ● ● ● |
| Poederschurft             | 55 | ● ● ● ● ● |
| Kringerigheid             | 81 | ● ● ● ● ● |
| Y-virus                   | 10 | ● ● ● ● ● |
| Yntn-virus knoltolerantie | 99 | ● ● ● ● ● |

| Aardappelmoeheid |           | Wratziekte |           |
|------------------|-----------|------------|-----------|
| Ro1/4 9          | ● ● ● ● ● | F1         | ● ● ● ● ● |
| Ro2/3 *8         | ● ● ● ● ● | F2         | ● ● ● ● ● |
| Ro5 *8           | ● ● ● ● ● | F6         | ● ● ● ● ● |
| Pa2 *6           | ● ● ● ● ● | F18        | ● ● ● ● ● |
| Pa3              | ● ● ● ● ● |            |           |


\* HZPC eigen meting / Geen officiële meting

### Bemesting

- Pas de bemesting aan op basis van de resultaten van de bodemanalyse.
- Raadpleeg altijd de lokale en huidige regels over gewasbemesting.
- Deelgift wordt aanbevolen, 2/3 voor het planten en 1/3 na knolzetting.
- Stikstof (N) : Hoge dosering (210-250Kg N/ha inclusief bodemvoorraad)
- Fosfaat (P) en Kalium (K) : volgens standaard advies.
- Voor een hogere opbrengst: zorg voor de juiste zwavelgift.



## Teeltadvies Consumptieteelt Frankrijk



### Voorbehandeling en poten

- TAI SIYA heeft een zeer lange kiemrust.
- Warm het pootgoed op en plant de knollen met witte puntjes.
- Warme stoot: Minimaal 3 weken.
- Behandel TAI SIYA pootgoed altijd tegen Rhizoctonia.
- In warme grond planten, niet te vroeg.




### Teelt

- De opkomst is gelijkmatig, met een goede loofontwikkeling.
- TAI SIYA is gevoelig voor metribuzin, kan alleen voor opkomst gespoten worden.
- TAI SIYA heeft een goede droogtetolerantie.



### Loofdding en oogst

- Minimaal 3 weken tussen loofding en rooien voor een goede huidvastheid.
- TAI SIYA is weinig gevoelig voor stootblauw. Wees wel alert als er onder extreme omstandigheden gerooid wordt.



### Bewaring

- Met het juiste bewaarregime, is TAI SIYA geschikt voor de lange bewaring.
- Bewaartemperatuur: 4 °C.
- Verlaag de temperatuur 0,5-0,7 °C per dag naar een stabiele waarde, niet lager dan 4°C.
- Ventileer kort maar regelmatig om CO2-ophoping te voorkomen.
- Omdat TAI SIYA een lange kiemrust heeft, is lange bewaring op een lage temperatuur, zonder kiemremmers mogelijk.