



Produção de batata de consumo France

- **Pele bastante atrativa e brilhante**
- **Alto rendimento**
- **Boa resistência à seca e ao calor**
- **Sabor muito bom**
- **Adequada para uma armazenagem de longa duração**

Propriedades agronômicas

Maturação	62	Semi tardia
Periodo de dormencia	80	Muito Longo
Produto final maturação	112	Alto
Tamanho tubérculos	79	Medio
Forma dos tubérculos		Oval
Numero de tubérculos		15-17
Cor da pele		Amarela
Polpa após cozinhar		Amarela
Tipo culinário		AB - Moderadamente firm
Peso de matéria seca/Aln		20,2% / 14,3%
Teor de matéria seca/Pes		370 / 1,079
Enegrecimento interno	14	Moderado sensível
Sens. ao Metribuzin	69	● ● ● ● ●
Formacao de Batatinhas	75	● ● ● ● ●



Cor da pele e carne



Tipo culinário



Maturação

Densidade de Plantação

Mercado: 40-75 mm.

Calibre	Densidade de plantação/ha	Distancia entre linhas	
		75 cm	90 cm
28/35	38.000	32	27
35/45	33.000	41	34
45/50	30.000	44	37
50/55	28.000	48	40

Profundidade de plantação: normal.

Verificar sempre a contagem de tubérculos para um cálculo correto.

Resistências

Mildio da folha	60	● ● ● ● ●
Mildio do tuberculo	70	● ● ● ● ●
Sarna comum	56	● ● ● ● ●
Sarna pulvuro lenta	55	● ● ● ● ●
Spraing	81	● ● ● ● ●
PVY	10	● ● ● ● ●
Yntn tolerancia tubérculos	99	● ● ● ● ●

Res. aos nematodos	Res. verruga
Ro1/4 9	F1
Ro2/3 *8	F2
Ro5 *8	F6
Pa2 *6	F18
Pa3	


* HZPC own analysis/no official analysis

Fertilização

- Adaptar a fertilização em função das análises do solo.
-
- Aplicar 2/3 antes da plantação e 1/3 na cobertura.
- Azoto (N): Aplicação elevada (210-250Kg N/Ha incluindo a disponibilidade no solo).
- Adubação com Potássio e Fosfatos de acordo com a recomendação padrão.
- Certifique-se de ter o fornecimento certo de enxofre.



Produção de batata de consumo France



Preparação e Plantação

- TAI SIYA tem uma dormência muito longa.
- Aquecer corretamente a semente e plantar com pequenos grelos brancos.
- Tratamento térmico : mínimo de 3 semanas.
- Tratar sempre as sementes de TAI SIYA e o solo contra Rhizoctonia.
- Plantação em solos quentes, não plantar muito cedo.




Cultivo

- Emergência uniforme, com um bom desenvolvimento da folhagem.
- TAI SIYA é muito sensível à Metribuzina, aplicar apenas em pré-emergência.
- TAI SIYA tem uma boa tolerância à seca.



Defenagem e Colheita

- Mínimo de 3 semanas entre a dessecagem das plantas e o arranque para ter uma pele completamente firme.
- TAI SIYA é muito resistente a golpes, exceto em condições extremas.



Armazenamento

- Com as corretas condições, TAI SIYA é adequada para armazenar longo período de tempo
- Temperatura de armazenamento: 4 °C.
- Reduzir a temperatura 0,5 °C-0,7 °C por dia, nunca inferior a 4 °C.
- Ventilar com regularidade para evitar acumulação de CO2.
- TAI SIYA tem uma longa dormência, o armazenamento a longo prazo a temperaturas mais baixas e sem inibidores germinativos é possível.