



Producción de consumo France

- Cocción firme
- Piel brillante muy atractiva
- Elevado número de tubérculos
- Buena calidad culinaria
- Buen almacenamiento



Propiedades agronómicas

Maduración	78	Temprana
Período de dormencia	61	Medio
Producción	91	Bien
Tamaño del tuberculo	73	Calibre pequeño
Forma		Oval-alargada
Número de tubérculos		12-14
Color de piel		Amarilla
Color carne cocinar		Amarilla
Tipo de coccion		A - Firme
Materia seca/Almidon %		18,8% / 13%
/Peso específico		342 / 1,073
Golpeo interno	10	Algo sensible
Sens. Metribuzin	66	●●●●●
Fenómeno patatitas	54	●●●●●



Color de piel y carne



Tipo de coccion



Maduración

Densidad de plantación

Calibre comercial: 35-55 mm.

Calibre	Densidad de plantación/ha	Distancia entre caballones	
		75 cm	90 cm
28/30	58.500	23	19
30/40	55.000	24	20
40/45	50.000	27	22
45/50	43.000	31	26

Profundidad de plantación (calibre grande y medio) : 3 cm más profundo de lo normal.

Comprobar siempre el número de tubérculos para un cálculo exacto.

Resistencias

Mildió en planta	46	●●●●●
Mildió en el tubérculo	79	●●●●●
Alternaria	60	●●●●●
Sarna común	69	●●●●●
Sarna verrugosa	54	●●●●●
Spraing	90	●●●●●
Virus Y	26	●●●●●
Tol. Yntn tubérculo	99	●●●●●

Res. a nemátodos

Ro1/4	9	●●●●●
Ro2/3	*7	●●●●●
Ro5	*5	●●●●●
Pa2		●●●●●
Pa3		●●●●●

Roña

F1	10	●●●●●
F2	*1	●●●●●
F6	*1	●●●●●
F18	*1	●●●●●

Fertilización

- Adaptar el abonado a los análisis del suelo.
- Nitrógeno (N): aporte medio (170-210Kg N/ha incluido las reservas del suelo).
- Fertilización con potasio y fosfato como recomendación general.
- TALENTINE es susceptible a carencias de minerales, por lo tanto fertilizar con microelementos.
- El manganeso y el magnesio proporcionan una planta fuerte y previenen la senescencia prematura.

* Datos internos de HZPC / No probado por un Organismo oficial



Producción de consumo France



Cultivo

- Dejar calentar la semilla correctamente y plantar con pequeños brotes blancos.
- Tratar siempre la semilla de TALENTINE contra rizoctonia.
- Plantar en terrenos cálidos, no plantar demasiado pronto.
- Plantar la semilla grande más profunda para evitar el verdeamiento.
- Tomar la precaución de hacer buenos caballones para evitar el verdeamiento.




Período de cultivo

- El uso de metribuzin se recomienda en preemergencia. En postemergencia utilizar dosis bajas.
- El riego proporciona un producto más uniforme con mejor calidad culinaria.
- Utilizar un programa estricto para la protección contra Phytophthora, debido a la susceptibilidad en la planta.



Destrucción de las plantas

- Materia seca deseada del 19 %.
- Mínimo tres semanas entre el quemado y la recogida para un correcto fijado de la piel.
- Reducir la velocidad de las cintas de la cosechadora para evitar golpes.
- Recoger solo cuando las condiciones del suelo son las adecuadas.



Almacenamiento

- Con un manejo adecuado de almacén, es posible conservar Tiger por largos periodos.
- Temperatura de almacenamiento: 4 °C.
- Reducir la temperatura en 0,5-0,7 °C por día hasta un valor estable que no sea inferior a 4 °C.
- Ventilar de forma regular pero breve para prevenir la acumulación de CO2.
- Cualquier fluctuación de temperatura combinada con condensaciones, puede dar lugar a brotaciones tempranas y un elevado riesgo a sarna plateada.
- Antes del confeccionamiento, calentar correctamente los tubérculos hasta alcanzar un valor estable interno entre 10°C - 12°C.