




Teeltadvies Consumptieteelt Frankrijk

- Vastkokend
- Zeer mooie heldere schil
- Hoog knolaantal
- Goede kookkwaliteit
- Goede bewaarbaarheid



Landbouwkundige eigenschappen

Rijptijd	78	Vroeg
Kiemrust	61	Gemiddeld
Opbrengst rijp	91	Goed
Grofheid	73	Fijn
Knolvorm		Lang-ovaal
Knolaantal		12-14
Schilkleur		Geel
Vleeskleur na koken		Geel
Kooktype		A - Vastkokend
Droge stof/Zetmeel %		18,8% / 13%
OWG/Soortelijk gewicht		342 / 1,073
Blauwgevoeligheid	10	Weinig gevoelig
Sencor gevoeligheid	66	● ● ● ● ●
Onderzeeërvorming	54	● ● ● ● ●



Schil- en vleeskleur



Kooktype



Rijptijd

Plantafstanden

Markt: 35-55 mm.

Maat	Knollen/ha	Rijafstand	
		75 cm	90 cm
28/30	58.500	23	19
30/40	55.000	24	20
40/45	50.000	27	22
45/50	43.000	31	26

Plantdiepte voor midden en grove maat: 3 cm dieper dan normaal.

Controleer altijd het knolaantal voor een juiste berekening.

Resistenties

Phytophthora loof	46	● ● ● ● ●
Phytophthora knol	79	● ● ● ● ●
Alternaria	60	● ● ● ● ●
Schurft	69	● ● ● ● ●
Poederschurft	54	● ● ● ● ●
Kringerigheid	90	● ● ● ● ●
Y-virus	26	● ● ● ● ●
Yntn-virus knoltolerantie	99	● ● ● ● ●

Aardappelmoeheid

Ro1/4	9	● ● ● ● ●
Ro2/3	*7	● ● ● ● ●
Ro5	*5	● ● ● ● ●
Pa2		● ● ● ● ●
Pa3		● ● ● ● ●

Wratziekte

F1	10	● ● ● ● ●
F2	*1	● ● ● ● ●
F6	*1	● ● ● ● ●
F18	*1	● ● ● ● ●

* HZPC eigen meting / Geen officiële meting

Bemesting

- Pas de bemesting aan op basis van de resultaten van de bodemanalyse.
- Raadpleeg altijd de lokale en huidige regels over gewasbemesting.
- Stikstof (N) : Normale dosering (170-210Kg N/ha inclusief bodemvoorraad)
- Fosfaat (P) en Kalium (K) : volgens standaard advies.
- TALENTINE is gevoelig voor gebreksziekten, daarom bemesten met sporenelementen.
- Extra attentie voor mangaan en magnesium bladbemesting.



Teeltadvies Consumptieteelt Frankrijk



Voorbehandeling en poten

- Warm het pootgoed op en plant de knollen met witte puntjes.
- Behandel TALENTINE pootgoed altijd tegen Rhizoctonia.
- In warme grond planten, niet te vroeg.
- Plant grover pootgoed dieper om groene knollen te voorkomen.
- Zorg voor een goede rugopbouw om groene knollen te voorkomen.




Teelt

- Het gebruik van metribuzin wordt voor opkomst geadviseerd. Gebruik na opkomst het lage doseringssysteem.
- Beregening zorgt voor een gelijkmatiger product en een betere kookkwaliteit.
- Houd een strak spuitschema aan, vanwege gevoeligheid voor Phytophthora in loof.



Loofdoding en oogst

- Streef naar een onderwatergewicht van 345 gram.
- Minimaal 3 weken tussen loofdoding en rooien voor een goede huidvastheid.
- Beperk de snelheid van de rooimat en valhoogtes om mechanische rooischade te voorkomen.
- Rooi alleen wanneer bodemcondities optimaal zijn.



Bewaring

- Met het juiste bewaarregime, is TALENTINE geschikt voor de lange bewaring.
- Bewaartemperatuur: 4 °C.
- Verlaag de temperatuur 0,5-0,7 °C per dag naar een stabiele waarde, niet lager dan 4°C.
- Ventileer kort maar regelmatig om CO2-ophoping te voorkomen.
- Elke temperatuurschommeling gecombineerd met condens kan resulteren in vroege kieming en een hoog risico op zilverscurft.
- Vóór verpakken: de aardappelen opwarmen tot 10-12 graden.