



Anbauempfehlung Speisekartoffeln CRISPS

- Sehr robuste Sorte
- Hoher Ertrag
- Eignet sich gut für viele Märkte
- Gute Trockentoleranz
- Gute Lagerfähigkeit



Sorteneigenschaften

Reifezeit	62	Mittelspät
Keimruhe	96	Sehr lang
Ertrag	98	Ziemlich hoch
Sortierung	80	Großfallend
Knollenform		Rund / Rund-oval
Knollenzahl		9-11
Schalenfarbe		Gelb
Fleischfarbe kochen		Hellgelb
Kochtyp		BC - Mehlig
TS/Stärke %		23,2% / 17,2%
UWG/Spez. Gewicht		430 / 1,093
Blaufleckigkeit	28	Sehr empfindlich
Metribuzin Empf.	70	● ● ● ● ●
Knöllchensucht	78	● ● ● ● ●



Schalen und Fleischfarbe



Kochtyp



Reifezeit

Pflanzabstände

Sortierung	Knollenzahl/ha	Reihenabstand	
		75 cm	90 cm
28/35	65 000	21	17
35/45	54 000	25	21
35/50	50 000	27	22
45/55	42 000	32	26
35/55	44 000	30	25
50/60 geschnitten	44 000	30	25

Pflanztiefe: normal

Resistenz

Krautfäule	64	● ● ● ● ●
Knollenfäule	62	● ● ● ● ●
Alternaria	71	● ● ● ● ●
Schorf	58	● ● ● ● ●
Pulverschorf	68	● ● ● ● ●
Eisenfleckigkeit	93	● ● ● ● ●
Y-Virus	62	● ● ● ● ●
Yntn Knollentoleranz	99	● ● ● ● ●

Nematodenresist.

Ro1/4	9	● ● ● ● ●	F1	3	● ● ● ● ●
Ro2/3	6	● ● ● ● ●	F2	7	● ● ● ● ●
Ro5	*9	● ● ● ● ●	F6	8	● ● ● ● ●
Pa2	*1	● ● ● ● ●	F18	*1	● ● ● ● ●
Pa3		● ● ● ● ●			


* HZPC-eigene Analyse / Keine offizielle Analyse

Düngung

- Der Nährstoffbedarf basiert auf den Bodenprobenergebnissen.
- Erste Zusatzdüngung (Stickstoff) direkt nach dem Knollenansatz.
- Stickstoff (N): Mittlerer Bedarf (170-210kg N/ha inklusive Bodenversorgung).
- Die Stickstoffgabe sollte zum 2/3 vor dem Pflanzen und zum 1/3 nach dem Knollenansatz erfolgen.
- Eine Kalium(Chlorid)gabe kurz vor der Blüte senkt das Risiko auf Blaufleckigkeit.
- Phosphatdünger nach der Standardempfehlung.
- TAURUS ist anfällig für Magnesiummangel, deswegen mit Spurenelementen düngen.



Anbauempfehlung Speisekartoffeln CRISPS



Vorbereitung und Pflanzung

- TAURUS hat eine lange Keimruhe.
- Die Apikaldominanz ist relativ hoch, daher bei der Vorkeimung auf die Raumtemperatur achten (nicht zu kalt).
- Das Pflanzgut vor dem Pflanzen an den örtlichen Gegebenheiten akklimatisieren.
- Die Pflanzkartoffeln nicht bei Temperaturen unter 5 °C lagern. Vor dem Pflanzen ausreichend aufwärmen.
- Eventuell vorhandene Apikalkeime entfernen. Pflanzen mit kleinen weißen Punkten in den Augen.
- TAURUS Pflanzgut und Boden immer gegen Rhizoctonia behandeln.




Anbau

- Die Entwicklung ist gleichmäßig, mit einer guten Laubentwicklung.
- TAURUS hat eine gute Toleranz gegen Trockenheit.
- Für eine frühe Sorte hat TAURUS eine gute Phytophthoresistenz.
- TAURUS ist anfällig für Alternaria. Die erste Behandlung während der Blütezeit durchführen.
- Eine vorbeugende Behandlung gegen Phytophthora wird empfohlen.



Krautregulierung und Ernte

- Stellen Sie sicher, dass der Bestand bei der Krautregulierung schon weit in der Abreife ist.
- Die Knollen sind großfallend. Vorsicht bei der Ernte und Lagerung, um Beschädigungen und Blaufleckigkeit zu vermeiden.
- TAURUS ist mittelanfällig für Blaufleckigkeit, daher Fallhöhen reduzieren und mechanische Beschädigungen vermeiden.



Lagerung

- TAURUS hat eine lange Keimruhe und eine gute Lagerfähigkeit.
- Gute Wundheilung ist wichtig.
- Regelmäßig aber kurz lüften, um eine CO₂-Anhäufung zu vermeiden.
- Bei einer stabilen Temperatur von 9-10 °C lagern.
- Da TAURUS eine lange Keimruhe hat, kann die Aufwandmenge an Keimhemmungsmitteln für die Langzeitlagerung reduziert werden.