



Producción de consumo GENERAL

- Piel brillante muy atractiva
- Elevada producción
- Apropriada como patata de verdete
- Buena resistencia al envasado
- Apropriada para almacenamientos largos

Propiedades agronómicas

Maduración	64	Semi- tardia
Período de dormencia	78	Largo
Producción	119	Muy alta
Tamaño del tubérculo	83	Calibre grande
Forma		Redonda-oval / Oval
Número de tubérculos		9-11
Color de piel		Amarilla clara
Color carne cocinar		Crema
Tipo de cocción		B - Ligeramente harinosos
Materia seca/Almidon %		18,5% / 12,7%
/Peso específico		336 / 1,071
Golpeo interno	8	Algo sensible
Sens. Metribuzin	63	● ● ● ● ●
Fenómeno patatitas	86	● ● ● ● ●



Color de piel y carne



Tipo de cocción



Maduración

Densidad de plantación

Calibre comercial: 50+ mm.

Calibre	Densidad de plantación/ha	Distancia entre caballones	
		75 cm	90 cm
28/35	35.000	38	32
35/45	36.000	37	31
45/55	34.000	39	33
35/55	34.000	39	33
55/65	32.500	41	34

Profundidad de plantación: normal.

Comprobar siempre el número de tubérculos para un cálculo exacto.

Resistencias

Mildíu en planta	50	● ● ● ● ●
Mildíu en el tubérculo	69	● ● ● ● ●
Alternaria	71	● ● ● ● ●
Sarna común	61	● ● ● ● ●
Sarna verrugosa	68	● ● ● ● ●
Spraing	84	● ● ● ● ●
Virus Y	99	● ● ● ● ●
Tol. Yntn tubérculo	99	● ● ● ● ●

Res. a nemátodos		Roña	
Ro1/4 *9	● ● ● ● ●	F1 *9	● ● ● ● ●
Ro2/3 *9	● ● ● ● ●	F2	● ● ● ● ●
Ro5	● ● ● ● ●	F6 *5	● ● ● ● ●
Pa2 *3	● ● ● ● ●	F18	● ● ● ● ●
Pa3	● ● ● ● ●		

* Datos internos de HZPC / No probado por un Organismo oficial

Fertilización

- Adaptar el abonado a los análisis del suelo.
- Consulte siempre las normas locales vigentes sobre fertilización de cultivos.
- Nitrógeno (N): aporte medio (170-210Kg N/ha incluido las reservas del suelo).
- Potasio (K): aproximadamente 250 kg de K/ha antes de la plantación. En suelos con niveles bajos de potasio hay que hacer una aportación adicional de 100 kg.
- Fosfato (P): aproximadamente 90-100 kg de K/ha antes de la plantación.
- Añadir Calcio y Boro en la fertilización para obtener unos mejores resultados en almacenaje.



Producción de consumo GENERAL



Cultivo

- TAYCAN tiene una dormencia larga.
- Dejar calentar la semilla correctamente y plantar con pequeños brotes blancos.
- Dejar atemperar la semilla un mínimo de 2 semanas.
- Tratar siempre la semilla de TAYCAN contra rizoctonia.




Período de cultivo

- TAYCAN es muy sensible a metribuzin, usarlo solo en preemergencia.
- Mantener una humedad adecuada del terreno para una buena cosecha y calidad.
- Utilizar un programa estricto para la protección contra Phytophthora, debido a la susceptibilidad en la planta.



Destrucción de las plantas

- Solo una cosecha con correcta maduración proporcionará un producto apto para un buen almacenamiento.
- Mínimo dos semanas entre el quemado y la recogida para un correcto fijado de la piel.
- Recoger solo cuando las condiciones del suelo son las adecuadas.



Almacenamiento

- Con un manejo adecuado de almacén, es posible conservar Tiger por largos periodos.
- Temperatura de almacenamiento: 5 °C.
- TAYCAN tiene una dormencia larga. Los inhibidores de brotación solo se necesitan para entregas tardías.